

Secretaria
de Saúde



MANUAL DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde

Manual de Acolhimento e Classificação de Risco

2ª Edição

Brasília – DF 2021

SS446m BRASIL, Secretaria de Estado de Saúde
Manual de Acolhimento e Classificação de Risco
/Secretaria de Estado de Saúde; Subsecretaria de
Atenção Integral a Saúde; Assessoria da Política
Nacional de Humanização, Diretoria de Enfermagem
-Brasília, 2021.
137 p.

1. Política Nacional de Humanização. 2.
Acolhimento. 3. Classificação de Risco. 4. Rede
de Urgência e Emergência. Título.

Apresentação

Apresentamos a segunda versão do Manual de Acolhimento e Classificação de Risco da Rede SES/DF que traz a atualização dos protocolos de acolhimento e classificação de risco nas portas fixas de urgência e emergência adulto, pediátrico e obstétrico. Estes protocolos foram publicados por meio de Portaria SES/DF Nº 135 de 03.03.2020, Portaria SES/DF Nº 807 de 01.10.2019 e Portaria SES/DF Nº 993 de 02.12.2019, respectivamente.

Este documento se pauta, sobretudo, na necessidade de otimização do serviço de urgência e emergência em que o fluxo de usuários aponta para a priorização no atendimento dos casos conforme a gravidade.

Para tanto, a equipe técnica da SES elaborou os Protocolos de Acolhimento e Classificação de Risco, os quais foram submetidos à Comissão Permanente de protocolos de Atenção à Saúde – CPPAS/SAIS, unidade responsável por coordenar a consulta pública.

Este Manual de Acolhimento e Classificação de Risco, pautado na Política Nacional de Humanização, continua se propondo a ser uma ferramenta de organização de processo de entrada dos usuários na rede, com critérios claros e sequenciamento de ações que promovam a humanização do cuidado, a fim de que este seja inclusivo e resolutivo. Ressalta-se que a parte introdutória deste Manual mantém as características da primeira versão com pequenos ajustes, tendo em vista, que os condicionantes de saúde que motivaram a primeira edição permanecem até hoje.

Por fim, espera-se que este trabalho possa continuar provocando mudanças com vistas ao bom atendimento do usuário do SUS/DF e consolidar caminhos de boas práticas já trilhados.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Secretário de Saúde: Manoel Luiz Narvaz Pafiadache

Secretária Adjunta de Assistência à Saúde: Raquel Beviláqua Matias da Paz Medeiros Silva

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde: Carlos Fernando Dal Sasso de Oliveira

Chefe de Gabinete: Helder Lucio Rego

Assessoria Especial: Sindulfo Teixeira Chaves

Assessoria de Comunicação: José Carlos Barroso

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos: Samara Furtado Carneiro

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais: Marcos Paulo Freire Malgueiro Lopes

Controladoria Setorial da Saúde: Rodrigo Ramos Gonçalves

Assessoria Jurídico Legislativo: Raphael Sampaio Malinverni

Diretoria do Fundo de Saúde do Distrito Federal: Everaldo de Melo Santos

Ouvidoria: Thyerys Araruna Almeida

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde: Aluizio Stremel Filho

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde: Marina da Silveira Araújo

Subsecretaria de Administração Geral: Luciano Pereira Miguel

Subsecretaria de Infraestrutura: Mário Furtado

Subsecretaria de Logística em Saúde: Rogéria de Oliveira Pinheiro Romanholo

Subsecretaria de Gestão de Pessoas: Silene Quitéria Almeida Dias

Subsecretaria de Vigilância em Saúde: Divino Valero Martins

Subsecretaria de Planejamento em Saúde: Christiane Braga Martins de Brito

Superintendência da Região de Saúde Central: Pedro Costa Queiroz Zancanaro

Superintendência da Região de Saúde Centro Sul: Flávia Oliveira Costa

Superintendência da Região de Saúde Sul: Lucimir Henrique Pessoa Maia

Superintendência da Região de Saúde Norte: Sabrina Irene Castro Gadelha

Superintendência da Região de Saúde Leste: Sidney Sotero Mendonça

Superintendência da Região de Saúde Oeste: Lucilene Maria Florêncio de Queiróz

Superintendência da Região de Saúde Sudoeste: Luciano Gomes Almeida

Hospital Materno Infantil de Brasília: Andreia Regina Araújo

Hospital de Apoio de Brasília: Alexandre Lyra de Aragão Lisboa

Hospital São Vicente de Paula: Paulo Henrique Porto dos Santos

Elaboração do Protocolo de Acolhimento e

Classificação de Risco - Clínico Adulto

(Ordem de Serviço nº 199, de 03/12/2018)

Andrea Simoni de Zappa Passeto

Amanda Sousa Rodrigues

Brenda Karla de Paula

Camila Carloni Gaspar

Cleidiane dos Santos Sá Valadares

Daniela Mendes dos Santos Magalhães

Daniella Souza da Silva

Fabiana Christina Olímpia Rocha

Francino Machado de Azevedo Filho

Franciara Letícia Moraes da Cunha

Izelina Helena de Freitas Antônio

Jessica Procópio de Quadros

Lucas Valente de Brito Oliveira

Luísa Pereira de Siqueira

Marcelo de Souza Melo

Marjan Maria de Medeiros Raulino

Michele dos Reis Almeida

Mirna Aparecida da Costa Ribeiro

Nayara Cintia Rodrigues Araújo

Priscila Litting Harchbart

Robson de Oliveira Nascimento

Sandro Rogério Gabriel dos Santos

Thais Silveira Leão

Viviane Katielle de Souza Pereira

Elaboração do Protocolo de Acolhimento e

Classificação de Risco Pediátrico

(Ordem de Serviço nº 200, de 03/12/2018)

Abdias Aires de Queiros Junior

Adriana de Fátima Poleiro

Alexandre Augusto da Silva

Anália Ribeiro Quintanilha

Andrea Simoni de Zappa Passeto

Barbara Regina da Mota

Bruno Leonardo Soares Nery

Carmem Livia Faria da Silva Martins

Claudio José Ferreira Lima Júnior

Cristina Akayo Kimura

Davi Maia Paraense Filho

Elisabeth Paranhos Pestana

Fabiane de Souza Oliveira

Ivana Ribeiro Novaes

Janaina Rabelo Araújo

João Alberto Neves Filho

Juliana de Assis Fores Domingues de Oliveira

Julister Maia de Moraes
Karla Karoline Queiroz de Carvalho
Leticia de Paiva Alcantara Gentil
Lizete Conceição De Souza Silveira
Luís Henrique Jorge Costa
Luísa Pereira de Siqueira
Marcelo de Sousa Melo
Maria da Guia Lopes de Araújo
Mirna Aparecida da Costa Ribeiro
Nayara Cintia Rodrigues Araújo
Priscila Litting Harchbart
Sandro Rogério Gabriel dos Santos
Viviane Katielle de Souza Pereira

**Elaboração do Protocolo de Acolhimento e
Classificação de Risco Obstétrico
(Ordem de Serviço nº 218, de 17/12/2018)**

Amanda Fedevkcyk de Vico
Gabrielle Oliveira Medeiros de Mendonça
Mariana Viana Almeida
Marta de Betânia Rabelo Teixeira

Miltair Baêta de Mello
Neuzimar Gonçalves da Silva
Roberto Costa Cavalcanti de Souza
Solange de Paiva Pinto
Comissão Permanente de Protocolos de Atenção à
Saúde
Beatriz Taynara Araújo dos Santos

Revisão Geral

Ana Cristina Lopes Machado Guimarães
Bruno Leonardo Soares Nery
Cristiane Pinto Costa Vieira
Gabrielle Oliveira Medeiros de Mendonça

Apoio

Eliene Ferreira de Sousa
Rodrigo Valim Meira

Arte e diagramação

ASCOM

Sumário

Apresentação	05
Introdução	13
Justificativa.....	16
Orientações Gerais para o Fluxo de Pacientes na Classificação de Risco.....	17
Como acontece o ACCR?.....	18
Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia	25
1-ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO.....	26
2-DESMAIO/ MAL ESTAR	27
3-DOR ABDOMINAL/ DOR LOMBAR/ CONTRAÇÕES UTERINAS	29
4-DOR DE CABEÇA/ TONTURA/VERTIGEM.....	31
5-FALTA DE AR /SINTOMAS RESPIRATÓRIOS.....	33
6-FEBRE/SINAIS DE INFECÇÃO/ DOR EM REGIÃO GENITAL/ DOR EM REGIÃO PERINEAL/ DOR NAS MAMAS	35
7-NÁUSEAS E VÔMITOS	37
8-PERDA DE LÍQUIDOS VIA VAGINAL	38
9-PERDA DE SANGUE VIA VAGINAL	40
10-PARADA/REDUÇÃO DE MOVIMENTOS FETAIS.....	42
11-QUEIXAS URINÁRIAS.....	43
12-RELATO DE CONVULSÃO	44
13-OUTRAS QUEIXAS/PACIENTES ENCAMINHADAS DE OUTRAS UNIDADES SEM REFERENCIAMENTO.....	45
Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco Adulto	47
1-ALTERAÇÕES CUTÂNEAS	48
2-ALTERAÇÕES DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, COMPORTAMENTO OU SENSÓRIO	50
3-CONVULSÃO	52
4-DESMAIO, TONTURA, VERTIGEM	53
5-DIARREIA E VÔMITOS	55
6-DOR ABDOMINAL OU QUEIXAS ABDOMINAIS	56
7-DOR CERVICAL	58
8-DOR DE CABEÇA	60
9-DOR DE GARGANTA.....	62
10-DOR NA COLUNA E EM EXTREMIDADES.....	63

11-DOR TORACICA	65
12-EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICOS.....	67
13-MORDEDURAS E PICADAS DE ANIMAIS	69
14-MAL-ESTAR GERAL.....	71
15-PALPITAÇÕES (BATEDEIRAS)	73
16-POLITRAUMAS.....	74
17-QUEIMADURAS.....	76
18-QUEIXAS OCULARES	77
19-QUEIXAS OTOLÓGICAS	78
20-QUEIXAS RESPIRATÓRIAS	79
21-QUEIXAS URINÁRIAS / DOR TESTICULAR	81
22-SANGRAMENTOS.....	82
23-TRAUMATISMO TORACOABDOMINAL.....	84
24-TRAUMAS	86
25-SITUAÇÕES ESPECIAIS.....	88
29-DADOS VITAIS ALTERADOS.....	89

Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco em Pediatria.....91

1-TOSSE, FALTA DE AR, DIFICULDADE PARA RESPIRAR, RESPIRAÇÃO RUIDOSA, CHIADO NO PEITO, OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS.....	92
2-ALTERAÇÕES NO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E SENSÓRIO, PARESIAS E PARALISIAS.....	95
3-DOR TORÁCICA	97
4-DOR DE CABEÇA	98
5-DOR ABDOMINAL	99
6-DOR DE GARGANTA.....	100
7-DOR DE OUVIDO	101
8-DOR EM EXTREMIDADES	102
9-VÔMITOS E DIARREIA (OBSERVAÇÃO: ATENTAR POR DIABETES)	103
10-ALTERAÇÕES CUTÂNEAS: FERIDAS, PALIDEZ, AFECÇÕES DE PELE	104
11-TRAUMA	106
12-QUEIMADURAS.....	107
13-INTOXICAÇÃO EXÓGENA	108
14-MORDEDURAS E PICADAS DE ANIMAIS	110
15-FEBRE.....	112
16-RN 0 A 3 MESES	114
17-VIOLÊNCIA FÍSICA; SEXUAL; TENTATIVA DE SUICÍDIO; ENVENENAMENTO; INTOXICAÇÕES INTENCIONAIS E ACIDENTE PERFURO CORTANTE E/OU EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO.	116
18-ANEMIA FALCIFORME	118

19-HEMOFILIA.....	119
20-COMPORTAMENTO SUICIDA	120
21-COMPORTAMENTO AGITADO OU AGRESSIVO	121
22-RECUSA EM SE ALIMENTAR E/OU TRANSTORNOS ALIMENTARES. CONFERIR PESO E ALTURA	122
23-QUEIXAS URINÁRIAS / DOR TESTICULAR	123
24-QUEIXAS OCULARES	124
Referências	125
Anexos	131
AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE DA DOR.....	131
ESCALA VISUAL DA DOR.....	131
ESCALA DE COMA DE GLASGOW	132
ESCALA DE COMA DE GLASGOW PEDIÁTRICA.....	132
DADOS VITAIS PEDIÁTRICO.....	133
REGRA DOS NOVE DE WALLACE PARA ADULTOS E CRIANÇAS ACIMA DE 10 ANOS - AVALIAÇÃO DA SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA.....	134
REGRA DOS NOVE DE WALLACE PARA ATÉ 10 ANOS - AVALIAÇÃO DA SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA	135
NOTA TÉCNICA N°10/2021 CAT - FLUXOS PARA COVID19	136
Fluxo Classificação de Risco Casos Suspeitos de Covid-19	137
ADULTOS COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS AGUDOS	137
GESTANTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS AGUDOS	138
CRIANÇAS E ADOLESCENTES <14 ANOS COM RESPIRATÓRIOS AGUDOS	139

INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde do Brasil (MS) foi criada em 2003 e busca pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde produzindo mudanças nos modos de agir, gerir e cuidar, e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários (BRASIL, 2013).

A PNH se estrutura a partir de princípios, métodos, diretrizes e dispositivos, caracterizando-se como uma política transversal e com indissociabilidade entre a atenção e a gestão (BRASIL, 2004). O MS, pela Portaria GM/MS nº 3.390 de dezembro de 2013, instituiu a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do SUS. Esta portaria estabelece diretrizes para a organização do Componente Hospitalar na Rede de Atenção à Saúde (RAS), onde considera o Acolhimento como uma escuta ética e adequada às necessidades de saúde dos usuários no momento de procura pelo serviço e na prestação de cuidados com o propósito de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.

O Acolhimento é uma diretriz da PNH, que não tem local nem hora para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo, pois entende-se que acolher faz parte de todos os encontros do serviço de saúde assim se constituindo em uma postura ética, política e estética. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde.

Entre as tecnologias utilizadas para reorganização dos processos de trabalho, o Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) tem se mostrado um dispositivo potente com resultados de maior satisfação de usuários e trabalhadores, aumento da eficácia clínica e um disparador de outras mudanças, como a constituição de equipes de referência, gestão compartilhada da clínica, o fortalecimento das RAS e a valorização do trabalho em saúde.

A Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, corresponde a priorização do atendimento em serviços e situações de urgência/emergência como um processo complexo, que demanda competência técnica e científica em sua execução, está regulamentada pela Resolução COFEN 423/2012, que normatiza no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do Enfermeiro na atividade de Classificação de Riscos (Brasil, 2004)

Em seu artigo 1º, a Resolução COFEN 423/2012 diz que: “No âmbito da equipe de Enfermagem, a Classificação de Risco e a priorização da assistência em serviços de urgência é privativa do Enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão”. Além disso a Resolução prevê

que o Enfermeiro deve estar dotado de conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico ao procedimento. Esse procedimento deverá ser executado no contexto do Processo de Enfermagem, atendendo-se as disposições da Resolução COFEN 358/2009 (Sistematização da Assistência de Enfermagem) e aos princípios da PNH (BRASIL, 2004).

A Portaria GM/MS nº 2048/2002 do Ministério da Saúde propõe a implantação, nas unidades de atendimento às urgências, do acolhimento e da “triagem classificatória de risco”. Conforme essa Portaria, o processo “deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento” (BRASIL, 2002).

A Portaria GM/MS nº 4279 de 30 de dezembro de 2010 da Rede de Atenção à Saúde (RAS) define todos os pontos de atenção como igualmente importantes para que se cumpram os objetivos da RAS e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam. Os pontos de atenção são os lugares institucionais onde se ofertam determinados serviços produzidos através de uma função de produção singular. (BRASIL, 2010).

A Resolução CFM nº 2079 de 14 de agosto de 2014 torna obrigatória a implantação do Acolhimento com Classificação de Risco para o atendimento dos pacientes em todos os serviços de pronto atendimento 24h da rede de complexidade intermediária (UPAS – Unidades de Pronto Atendimento) e hospitalares. Ainda, destaca que todos os pacientes nesses espaços, independente do agravo, deverão ser atendidos por um profissional médico e não podem ser dispensados ou encaminhados a outras unidades por profissional não- médico.

Os protocolos de classificação são instrumentos que sistematizam a avaliação. Vale ressaltar que não se trata de fazer diagnóstico prévio nem de excluir pessoas sem que tenham sido atendidas pelo médico, mas a classificação de risco é realizada pelo enfermeiro, baseado em consensos estabelecidos conjuntamente com a equipe médica para avaliar a gravidade ou o potencial de agravamento do caso, assim como o grau de sofrimento do paciente. Portanto, a classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, em acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento (BRASIL, 2006).

O Ministério da Saúde recomenda a ferramenta do Acolhimento com Classificação de Risco, que pressupõe a determinação de agilidade no atendimento a partir da análise, sob a óptica de protocolo pré-estabelecido, do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada (BRASIL, 2004).

A implantação sistemática do ACCR possibilita a abertura de processos de reflexão e aprendizado institucional de modo a ressignificar os modos de fazer e construir novos modelos e valores, avançando em ações humanizadas e compartilhadas, ampliando a resolutividade ao incorporar critérios de avaliação de risco que consideram a complexidade do processo de saúde/doença, o grau de sofrimento dos usuários e família, a priorização da atenção em tempo oportuno diminuindo o número de mortes evitáveis, sequelas e internações.

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), através da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (SAIS) vem desenvolvendo ações para viabilizar a reestruturação da PNH no âmbito do SUS/DF em conformidade com a RAS e, especificamente, a Rede de Urgência e Emergência (RUE). Para tanto, como mecanismo para fortalecer, organizar, integrar e normatizar os processos de trabalho, definiu-se Protocolos de Acolhimento e Classificação de Risco nas Portas Fixas de Urgência e Emergência – Obstétrico, Adulto e Pediátrico que contribuirão diretamente para a efetivação da Diretriz da PNH Acolhimento, no âmbito do SUS/DF.

JUSTIFICATIVA

A elaboração desse manual visa nortear os profissionais de saúde no planejamento e execução das atividades de acolhimento nos serviços de urgência/emergência, mediante a tomada de decisão como parte integrante e importante da prática clínica.

A classificação de risco requer tanto raciocínio lógico, conhecimento técnico, e ambos devem se basear em conhecimentos e formação profissional. Deste modo, como parte de sua formação profissional é preciso que se aprenda a avaliar, discriminar e interpretar.

O protocolo é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão clínica e uma forma de padronização da linguagem para as urgências clínicas, traumáticas e obstétricas, e tem por finalidade a pronta identificação dos usuários mais graves, permitindo um atendimento rápido, seguro e oportuno, de acordo com o potencial de risco.

Nesse sentido, este protocolo justifica-se pela necessidade em oferecer orientações e padronização de condutas aos profissionais que atuam nos serviços de urgência e emergência, a fim de diminuir a peregrinação dos usuários nos serviços de saúde evitando as demoras que resultam em desfechos desfavoráveis, de viabilizar o acesso qualificado e o atendimento com resolutividade, em tempo adequado para cada caso.

Orientações Gerais para o Fluxo de Pacientes na Classificação de Risco

O Acolhimento com Classificação de Risco é uma ferramenta utilizada para organização dos fluxos, baseada em critérios visando priorizar os atendimentos aos usuários conforme o grau de prioridade, atentando para a criticidade do quadro de saúde / doença.

O acolhimento tem início com chegada do usuário à unidade de saúde com a identificação do quadro, situação, queixa ou episódio apresentado. Os protocolos que compõem este manual foram construídos por equipe multiprofissional, baseados em evidências da literatura, que estratifica a classificação de risco por cores (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), de acordo com a complexidade; tendo sido validados pelas equipes assistenciais de uma unidade de urgência e emergência em uma unidade hospitalar da SES/DF e uma Unidade de Pronto Atendimento de uma das sete Regiões de Saúde da SES/DF, pela Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia da SES/DF e pelo Grupo Condutor Central da Rede Cegonha no DF, Grupo Condutor da Rede de Urgência e Emergência no DF.

Recomenda-se a revisão e atualização dos referidos protocolos a cada dois anos, ou em menor período, caso necessário.

COMO ACONTECE O ACCR?

A Sistematização do ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO deve acontecer em etapas conforme descreveremos abaixo:

ETAPAS:

1ª ETAPA: Usuários chegam à Emergência por demanda espontânea, conduzidos pelo SAMU 192 e Corpo de Bombeiro Militar ou referenciados de outros serviços.

2ª ETAPA: Abertura de Ficha de Atendimento - Guia de Atendimento de Emergência (GAE).

3ª ETAPA: Acolhimento por profissional treinado que acolherá a livre demanda pela escuta ativa qualificada e encaminhará para a classificação de risco.

4ª ETAPA: Após o acolhimento, o/a usuário (a) deverá ser avaliado pela equipe a partir dos seguintes passos:

Avaliação inicial: tem como objetivo afastar o risco iminente de morte.

1º Passo: Identificar o motivo da procura a unidade/serviço (queixa principal).

2º Passo: A partir da queixa principal identificar o fluxograma correspondente e realizar a Classificação de Risco. Ainda neste passo, verificar ventilação, circulação, sinais vitais e, em gestantes, avaliar a dor.

3º Passo: Estratificar o risco conforme o fluxo pré-estabelecido no prontuário do eletrônico do paciente.

4º Passo: O tempo decorrido entre a abertura da GAE e a classificação de risco deverá ser de até 15 minutos. O tempo alvo para a Classificação é de até 05 minutos. Os pacientes que não forem atendidos no tempo preconizado da classificação poderão ser reclassificados de acordo com possíveis alterações do quadro.

5ª ETAPA: Realizar a identificação com as pulseiras de classificação.

6ª ETAPA: Direcionar o usuário para a especialidade de atendimento apropriada

Obs.: Os pacientes conduzidos obedecerão à classificação /regulação prévia do CRDF.

ATENÇÃO: É vetado o classificador realizar encaminhamentos para outras unidades assistências. Os encaminhamentos para as UBS ou outro serviço de saúde, poderão ser realizados desde que sejam realizados pactuações nas Superintendências de Saúde de forma a garantir o acesso e atendimento do/a usuário/a pela equipe multiprofissional nesse serviço.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM CORES:*I. Classificação Vermelho:*

- ❖ Atendimento nas salas de emergência, bloco de emergência, sala vermelha;
- ❖ São pacientes com risco iminente de morte necessitando de atendimento médico imediato;
- ❖ As medidas de manutenção da vida deverão ser iniciadas em qualquer ponto de atenção da rede;
- ❖ Tempo de atendimento alvo: imediato.

II. Classificação Laranja:

- ❖ Atendimento em consultório médico se condições e/ou sala de emergência, se necessário;
- ❖ São pacientes com potencial risco de agravo necessitando de atendimento médico e assistência de enfermagem contínua;
- ❖ As medidas de manutenção da vida deverão ser iniciadas em qualquer ponto de atenção da rede;
- ❖ Tempo de atendimento alvo: 10 minutos

III. Classificação Amarelo:

- ❖ São pacientes que necessitam de atendimento médico mediato podendo ser atendidos nos consultórios médicos do pronto atendimento por ordem de chegada;
- ❖ As medidas de promoção em saúde e prevenção de agravos deverão ser iniciadas em qualquer ponto de atenção da Rede;
- ❖ Tempo de atendimento alvo: 60 minutos, exceto obstetrícia tempo alvo 30 minutos.

IV. Classificação Verde:

- ❖ Por definição, são pacientes sem risco de agravo e serão atendidos por ordem de chegada;
- ❖ Necessidade de atendimento por profissional de saúde em até 48 horas, ou mediante agendamento na mesma semana em UBS de referência;
- ❖ O Classificador deverá orientar quanto à carteira/relação de serviços disponibilizados pelas Unidades Básicas de Saúde;
- ❖ Tempo de atendimento alvo: 06 horas nos casos de atendimento no Hospital ou UPA, exceto em obstetrícia tempo alvo 02 horas.

V. Classificação Azul:

- ❖ Necessidade de atendimento por profissional de saúde em até 48 horas, ou mediante agendamento na mesma semana em UBS de referência;
- ❖ Serão referenciados para as UBS para atendimento ou agendamento, exceto em condições que demandem atendimento mediato em horários de não funcionamento da UBS;
- ❖ Se gestante, caso não haja pactuação com a atenção primária e/ou a usuária se recusar a procurar o serviço de referência, deverá ser garantido o atendimento na maternidade;
- ❖ Podem ser atendidos em consultórios do pronto atendimento por ordem de chegada;
- ❖ O Classificador deverá orientar quanto à carteira/relação de serviços disponibilizados pelas Unidades Básicas de Saúde;
- ❖ Tempo de atendimento alvo: 12 horas nos casos de atendimento no hospital ou UPA. Se gestante, atendimento não prioritário ou encaminhamento conforme pactuação.

OBSERVAR E AVALIAR

Tempo de início da queixa ou evento, definido em:

Início abrupto: início do evento em segundos ou minutos;

Agudo: período de tempo entre 12 e 24 horas;

Recente: são aqueles que surgiram nos últimos sete dias.

Em seguida, avaliar nível de consciência/estado mental. As alterações do nível de consciência/estado mental devem ser avaliadas pela Escala de Coma de Glasgow. Pacientes com rebaixamento do nível de consciência ou alteração do estado mental são classificadas como vermelho/laranja. Estes pacientes apresentam via aérea desprotegida, com risco iminente de aspiração pulmonar devendo ser imediatamente encaminhados para a Sala Vermelha.

Análise primária - O risco de morte estará presente na ausência ou instabilidade de sinais vitais, assim descritos:

1. Comprometimento das vias aéreas: A incapacidade de manter via aérea pérvia, estridor inspiratório e expiratório representam grave risco.
2. Respiração ineficaz: Quando a paciente apresenta sinais de esforço respiratório como batimento de asa de nariz, cianose de extremidades e uso de musculatura acessória.
3. Circulação:
 - Ausência de pulso durante a palpação por 5 segundos do pulso central indica PCR.
 - Observar sinais de choque (ausência de pulso periférico ou pulso periférico fino associado à sudorese, palidez, taquicardia, hipotensão e alteração do estado de consciência).

- Presença de hemorragia: na hemorragia grave, a morte ocorrerá rapidamente se ela não for interrompida.

Em gestantes e puérperas considerar:

- A hemorragia exanguinante é aquela cujo sangramento se mantém sustentado com perda abrupta de mais de 1500 ml;
 - Sangramento intenso é a perda brusca ≥ 150 ml ou mais em 20 minutos (dois absorventes noturnos);
 - Sangramento moderado é a perda entre 60 a 150 ml em 20 minutos (um absorvente noturno);
 - Sangramento leve é a perda ≥ 60 ml em 6 horas (um absorvente normal).
4. Avaliação da dor: esta avaliação é realizada através de Escalas Visuais Analógicas (EVA) associada a pelo menos uma alteração de sinais vitais.

Em gestantes, como abordar a paciente?

Você tem dor?

Em uma escala de 0 a 10, como você classifica sua dor, considerando como 0 nenhuma dor e 10 a pior dor que você pode imaginar?

- Se não tiver dor, a classificação é **zero**;
- Se a dor for leve, seu nível de referência é de **1 a 3**;
- Se a dor for moderada, seu nível de referência é de **4 a 6**;
- Se for intensa, seu nível de referência é de **7 a 10**.

5. Sinais vitais de mensuração obrigatória na Classificação de Risco (CR) por público-alvo:

Gestantes e Puérperas:

- Pressão arterial
- Glicemia Capilar.
- Frequência cardíaca
- Avaliação da dor

Adultos e Idosos:

- Pressão arterial: idosos, hipertensos, diabéticos, obesos e usuários com queixas de cefaleia, vertigem e relato desmaios;
- Glicemia capilar: usuários com história de diabetes, queixas de vertigem ou relato desmaio;
- Frequência cardíaca: usuários cardiopatas ou com queixas de dor torácica, relato de intoxicação exógena e convulsão.
- Temperatura corporal: Aferição no fluxo onde a mensuração da temperatura é pedida e a critério do classificador.

Crianças e Adolescentes

- Frequência cardíaca;
- Glicemia capilar e Pressão arterial: Conforme o fluxo;
- Oximetria de pulso;
- Temperatura corporal

SITUAÇÕES ESPECIAIS:

1. Pacientes referenciados (com encaminhamento e classificação de risco) da APS ou SAMU 192 deverão ser encaminhados para a sala de classificação de risco imediatamente;
2. Pacientes referenciados da APS previamente classificados como **VERMELHO** terão atendimento médico **IMEDIATO**;
3. Pacientes conduzidos pelo SAMU 192 e previamente classificados como **VERMELHO** terão atendimento médico **IMEDIATO**;
4. Pacientes para troca de sondas e/ou traqueostomias, administração de medicamentos de posse de receita para continuidade de tratamento, serão conduzidos para a equipe de enfermagem;
5. Pacientes para curativos, serão atendidos no hospital somente durante o dia nos horários em que a UBS não estiver funcionando.

Benefícios esperados

Para a implantação e implementação deste Manual não se aplicam conduta preventiva, tratamento farmacológico e não farmacológico ou ainda acompanhamento pós-tratamento e necessidade de termo esclarecimento e responsabilidade.

Esperamos que as medidas recomendadas proporcionem aos usuários do sistema público de saúde do DF os meios necessários para melhorar o acesso aos serviços de urgência e emergência. A adoção do Manual de Acolhimento e Classificação de Risco da SES/DF favorecerá o aprimoramento da atenção à saúde ao usuário e a articulação entre todos os níveis de atenção, ordenada pela APS, o que permite a corresponsabilização dos gestores e profissionais envolvidos na assistência nos diferentes níveis de atenção.

Monitoramento

Os resultados serão monitorados mensalmente pelas Gerências de Emergência por meio de indicadores de monitoramento, processo e resultados.

Os indicadores sugeridos para o monitoramento e avaliação do processo de

implantação/implementação do Protocolo de ACCR devem ser coletados por meio dos Sistemas Oficiais de Informações da SES/DF, e são:

- I. Relação entre usuários cadastrados, classificados (CR) e atendidos (pelo profissional médico).
- II. Percentual de usuários segundo classificação de gravidade por especialidade/encaminhamento (VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE e AZUL);
- III. Tempos de espera (chegada do paciente até a classificação, classificação até o atendimento médico) e de permanência de acordo com a classificação;
- IV. Percentual de Internações;
- V. Percentual de encaminhamentos para outras regiões ou RIDE-DF;
- VI. Percentual de atendimentos de pacientes oriundos da RIDE-DF.

Regulação/Controle/Avaliação pelo Gestor

Os dados coletados anualmente pelas Regiões de Saúde, através dos indicadores pactuados neste protocolo, servirão para o planejamento das ações dos gestores de cada localidade e das áreas técnicas responsáveis. Sendo, a Diretoria de Serviços de Urgência, Apoio Diagnóstico e Cirurgias – DUAEC/CATES/SAIS e o coordenador do Grupo Condutor Central da Rede Cegonha os responsáveis pelo monitoramento e avaliação.

Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia

Área (s): Diretoria de Enfermagem, Diretoria de Serviços de Urgência, Apoio Diagnóstico e Cirurgias, Grupo Condutor Central da Rede Cegonha no, Assessoria Técnica da Política Nacional de Humanização, Assessoria Técnica de Redes de Atenção à Saúde.

A organização das portas de entrada dos serviços de urgência obstétrica, tem se tornados um desafio para as unidades de urgência e emergência em obstetrícia, nesse sentido a implementação do acolhimento com classificação de risco torna-se ferramenta indispensável no intuito de organizar as entradas dos serviços obstétricos, possibilitando o acesso humanizado com escuta qualificada garantindo qualidade as mulheres que procuram assistência de saúde no período gravídico puerperal, dessa forma impactando diretamente na redução dos indicadores de morbidade e mortalidade materna e perinatal.

O Manual tem como propósito apoiar à decisão clínica, realizando a estratificação da criticidade dos pacientes por nível de gravidade, a partir de uma análise sistemática das situações que ameaçam a vida.

1-Critérios de Inclusão

Todas as gestantes e puérperas, até 42 dias após o parto, que procurarem atendimento nas portas de urgência/emergência obstétrica da Rede SES/DF.

2-Critérios de Exclusão

Outras condições relacionadas a saúde da mulher, não relacionadas à gestação em curso ou ao puerpério.

ATENÇÃO: É vetado o classificador realizar encaminhamentos para outras unidades assistências. Os encaminhamentos para as UBS ou outro serviço de saúde, poderão ser realizados desde que sejam realizados pactuações nas Superintendências de Saúde de forma a garantir o acesso e atendimento do/a usuário/a pela equipe multiprofissional nesse serviço.

ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO	
ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO	1-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 2-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 3-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração do nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 4-Disfunção Orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais) 5-Alterações de glicemia Glicemia ≤ 70 mg/dL ou ≥ 250 mg/dL
	VERMELHO
	1-Alteração do estado mental Descritor: Uso de álcool e drogas ilícitas ou hálito etílico 2-Saturação de O₂ ≥ 92% e ≤ 94% em ar ambiente 3-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 4-PAS ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 5-Risco Iminente de agressão a terceiros Descritor: Presença de ideação, intenção ou planos homicidas. 6-Risco iminente de autoagressão Descritor: Presença de ideação, intenção ou planos suicidas
	LARANJA
	1-História de Trauma 2-História de doença psiquiátrica 3-História de perda da consciência
	AMARELO
	1-Puérpera com alteração do humor e labilidade emocional Descritor: Alterações repentinas e intensas no humor ou estado de ânimo. 2-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 3-Encaminhamento de outras Unidades de Saúde
	VERDE
	1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS
	AZUL

DESMAIO/MAL ESTAR GERAL	
DESMAIO/MAL ESTAR GERAL	1-Não responsiva 2-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 3-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 4-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80mmHg), taquicardia (FC: 120-140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 5-Disfunção orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais sinais) 6-Alterações de glicemia Descritor: (glicemia ≤ 70 mg/dl ou ≥ 250mg/dl)
	VERMELHO
	1-Saturação de O² ≥ 92% e ≤ 94% em ar ambiente 2-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 3-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 4-Alteração de estado mental Descritor: Uso de álcool e drogas ilícitas ou hálito etílico. 5-Febre alta: Tax ≥ 40°C 6-Portadora de doença falciforme em crise dolorosa Descritor: Dor intensa (7-10/10)
	LARANJA
	1-PAS de 140-159 mmHg e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 2-Febre: Tax de 38° C a 39,9° C 3-Pacientes imunodeprimidas Descritor: Portadores de HIV; portadores de deficiência congênita de imunoglobulinas; usuários crônicos de corticoides; usuários de imunossupressores; pacientes pós-transplante de órgão sólidos e de tecido hematopoiético
	AMARELO
	1-Febril: Tax: 37,5° C a 37,9° C 2-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 3-PAS ≤ 139 mmHg e PAD ≤ 89 mmHg 4-Encaminhamento de outras Unidades de Saúde
	VERDE

	1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS	AZUL
--	--	-------------

DOR ABDOMINAL/LOMBAR/CONTRAÇÕES UTERINAS		
DOR ABDOMINAL/LOMBAR/CONTRAÇÕES UTERINAS	1-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 2-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 3-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg), taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 4-Disfunção orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (dois ou mais sinais) 5-Hemorragia exangüinante /Hipertonia uterina Descritor: Perda de ≥ 1.500ml (um lençol encharcado abruptamente) 6-Prolapso de cordão umbilical 7-Exteriorização ou visualização de partes fetais 8-Trauma abdominal 9-Perda de líquido esverdeado espesso	VERMELHO
	1-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 2-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia e/ou alterações visuais 3-Contrações a cada 2 minutos 4-Sangramento intenso/ Hipertonia Uterina Descritor: Perda brusca ≥ 150 ml em 20 minutos (+ de dois absorventes noturnos) 5-Portadora de HIV em trabalho de parto 6-Pós-parto imediato 7-Dor intensa (7-10/10)	LARANJA
	1-Contrações uterinas a intervalos de 3 a 5 minutos 2-Sangramento moderado Descritor: Perda de 60 a 150 ml em 20 minutos (um absorvente noturno) 3-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 4-Perda de líquido esverdeado fluido 5-Dor moderada (4-6/10)	AMARELO

	1-Perda de líquido claro 2-Dor leve (1-3/10) 3-Febril Tax: 37,5°C a 37,9°C 4-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 5-Encaminhamento de outras Unidades de Saúde	VERDE
	1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS	AZUL

DOR DE CABEÇA/TONTURA/VERTIGEM	
DOR DE CABEÇA/TONTURA/VERTIGEM	1-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 2-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 3-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 4-Disfunção orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais) 5-Alterações de glicemia Descritor: (glicemia ≤ 70 mg/dl ou ≥ 250mg/dl)
	1-Saturação de O² ≥ 92% e ≤ 94% em ar ambiente 2-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 3-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia e/ou epigastralgia e/ou alterações visuais 4-Alteração de estado mental Descritor: Uso de álcool e drogas ilícitas ou hálito etílico. 5-Dor intensa (7-10/10) 6-Distúrbio de equilíbrio, perda da visão, sinais de meningismo Descritor: sinais de meningismo: vômitos em jato, fotofobia, cefaleia 7-Febre alta: Tax: > 40°C
	1-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 2-Náuseas e vômitos de início agudo e persistente 3-Febre: Tax: ≤ 38°C a 39,9°C 4-Dor moderada (4-6/10)
	1-Perda de líquido claro 2-Dor leve (1-3/10) 3-Febril Tax: 37,5°C a 37,9°C 4-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas
	VERMELHO
	LARANJA
	AMARELO
	VERDE

	5-Encaminhamento de outras Unidades de Saúde	
	1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS	AZUL

FALTA DE AR/SINTOMAS REPIRATÓRIOS	
FALTA DE AR/SINTOMAS REPIRATÓRIOS	1-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 2-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 3-Estridor Descritor: som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea 4-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração do nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 5-Disfunção orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais)
	VERMELHO
	1-Saturação de O² ≥ 92% e ≤ 94% em ar ambiente 2-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 3-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 4-Dispneia de Início súbito após trauma 5-Dor intensa (7-10/10) 6-Febre alta: Tax: > 40°C
	LARANJA
	1-Dispneia moderada 2-Descritor: consegue falar frases longas 3-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 4-Edema unilateral de MMII ou/e dor na panturrilha 5-Dor moderada (4-6/10) 6-Febre Tax: 38°C a 39,9°C
	AMARELO
	1-Obstrução nasal com secreção amarelada 2-Tosse produtiva e persistente 3-Dor leve (1-3/10) 4-Febril Tax: 37,5°C a 37,9°C 5-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 6-Encaminhamento de outras unidades de saúde
	VERDE



1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS

AZUL

FEBRE/ SINAIS DE INFECÇÃO/ DOR EM REGIÃO GENITAL/ DOR EM REGIÃO PERINEAL/ DOR NAS MAMAS	FEBRE/ SINAIS DE INFECÇÃO/ DOR EM REGIÃO GENITAL/ DOR EM REGIÃO PERINEAL/ DOR NAS MAMAS	
	1-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 2-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 3-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração do nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 4-Disfunção orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais)	VERMELHO
	1-Saturação de O² ≥ 92% e ≤ 94% em ar ambiente 2-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 3-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 4-Dor intensa (7-10/10) 5-Febre alta: Tax: > 40°C	LARANJA
	1-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 2-Sinais de infecção em sítio cirúrgico 3-Ingurgitamento mamário com sinais flogísticos Descritor: dor, calor, rubor e edema 4-Pacientes imunodeprimidas Descritor: Portadores de HIV; portadores de deficiência congênita de imunoglobulinas; usuários crônicos de corticoides; usuários de imunossupressores; pacientes pós-transplante de órgão sólidos e de tecido hematopoiético 5-Dor moderada (4-6/10) 6-Febre Tax: 38°C a 39,9°C	AMARELO
	1-Lesões genitais agudas 2-Ingurgitamento mamário sem sinais flogísticos 3-Queixas urinárias 4-Dor leve (1-3/10) 5-Febril Tax: 37,5°C a 37,9°C 6-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas	VERDE

	7-Encaminhamento de outras unidades de saúde	
	1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS	AZUL

NAÚSEAS E VÔMITOS	
NAÚSEAS E VÔMITOS	1-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose Saturação de O₂ < 92% em ar ambiente Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração do nível de consciência (ansioso e/ou confuso) Disfunção Orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais) Alterações de glicemia Descritor: (glicemia ≤ 70 mg/dl ou ≥250mg/dl)
	1-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 2-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 3-Febre alta: Tax: ≥ 40°C
	1-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 2-Vômitos com sinais de desidratação Descritor: sinais de desidratação: hipotensão, taquicardia, turgor de pele deficiente TEC > 2 segundos. 3-Febre Tax: 38°C a 39,9°C
	1-Vômitos frequentes sem desidratação Descritor: sinais de desidratação: hipotensão, taquicardia, turgor de pele deficiente TEC < 2 segundos. 2-Febril Tax: 37,5°C a 37,9/C 3-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 4-Encaminhamento de outras unidades de saúde
	1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS
	VERMELHO
	LARANJA
	AMARELO
	VERDE
	AZUL

PERDA DE LÍQUIDOS VIA VAGINAL	
PERDA DE LÍQUIDOS VIA VAGINAL	1-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 2-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 3-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração do nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 4-Disfunção Orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais) 5-Prolapso de cordão umbilical 6-Exteriorização ou visualização de partes fetais 7-Perda de líquido esverdeado espesso
	VERMELHO
	1-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 2-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 3-Trabalho de parto (contrações a cada 2 minutos) 4-Portadora de HIV 5-Dor intensa (7-10/10) 6-Febre alta: Tax: ≥ 40°C
	LARANJA
	1-Contrações uterinas a intervalos de 3 a 5 minutos 2-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 3-Perda de líquido esverdeado fluido 4-Dor moderada (4-6/10) 5-Febre Tax: 38°C a 39,9°C
	AMARELO
	1-Perda de líquido claro 2-Perda de tampão mucoso 3-Dor leve (1-3/10) 4-Febril Tax: 37,5°C a 37,9°C 5-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 6-Encaminhamento de outras unidades de saúde
	VERDE



1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS

AZUL

PERDA DE SANGUE VIA VAGINAL	
PERDA DE SANGUE VIA VAGINAL	1-Não responsiva 2-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 3-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 4-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 5-Disfunção Orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais) 6-Hemorragia exanguinante Descritor: Perda brusca de sangue ≥ 150 mL em 20 minutos (+ de dois absorventes noturnos); 7-Exteriorização ou visualização de partes fetais 8-Trauma abdominal
	1-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 2-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 3-Sangramento intenso/ hipertonia uterina Descritor: perda brusca ≥ 150 ml em 20 minutos (+ de dois absorventes noturnos) 4-Trabalho de parto (contração a cada 2 minutos) 5-Dor intensa (7-10/10) 6-Febre alta: Tax: ≥ 40°C
	1-Sangramento moderado Descritor: perda de 60 a 150 ml em 20 minutos (um absorvente noturno); 2-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 3-Contrações uterinas a intervalos de 3 a 5 minutos 4-Dor moderada (4-6/10) 5-Febre Tax: 38°C a 39,9°C
	1-Sangramento leve Descritor: perda < 60ml em 6 horas (um absorvente normal); FC ≤ 90 bpm; PAS: normal 2-Dor leve (1-3/10)
	VERMELHO
	LARANJA
	AMARELO
	VERDE

	3-Febril Tax: 37,90C a 37,90C 4-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 5-Encaminhamento de outras unidades de saúde	
--	---	--

PARADA/ REDUÇÃO DE MOVIMENTOS FETAIS	
PARADA/ REDUÇÃO DE MOVIMENTOS FETAIS	1-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 2-Saturação de O₂ < 92% em ar ambiente 3-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração do nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 4-Disfunção Orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais)
	1-Saturação de O₂ ≥ 90% e ≤ 94% em ar ambiente 2-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 3-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 4-Febre Alta Tax: ≥ 40°C 5-Dor intensa (7-10/10)
	1-Relato de ausência de movimento fetal por mais de 12 horas em Gestação ≥ 26 semanas 2-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 3-Febre Tax: 38°C a 39,9°C 4-Dor moderada (4-6/10)
	1-Relato de ausência de movimento fetal por mais de 12 horas em gestação >22 semanas e < 26 semanas 2-Relato de ausência de movimento fetal por menos de 12 horas em gestação de >26 semanas 3-Dor leve (1-3/10) 4-Febril Tax: 37,9°C a 37,9°C 5-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 6-Encaminhamento de outras Unidades de Saúde
	1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS
	VERMELHO
	LARANJA
	AMARELO
	VERDE
	AZUL

QUEIXAS URINÁRIAS	
QUEIXAS URINÁRIAS	1-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose 2-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 3-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração do nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 4-Disfunção Orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais)
	1-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 2-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 3-Trabalho de parto (contrações a cada 2 minutos) 4-Portadora de HIV 5-Dor intensa (7-10/10)
	1-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 2-Retenção urinária 3-Pacientes Imunodeprimidas Descritor: Portadores de HIV; portadores de deficiência congênita de imunoglobulinas; usuários crônicos de corticoides; usuários de imunossupressores; pacientes pós-transplante de órgão sólidos e de tecido hematopoiético 4-Dor moderada (4-6/10) 5-Febre Tax: 38°C a 39,9°C
	1-Lesões vulvares externas 2-Febril Tax: 37,90C a 37,90C 3-Dor leve (1-3/10) 4-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 5-Encaminhamento de outras Unidades de Saúde
	1-Atendimento não prioritário ou encaminhamento à UBS
	VERMELHO
	LARANJA
	AMARELO
	VERDE
	AZUL

RELATO DE CONVULSÃO		
RELATO DE CONVULSÃO	1-Não responsiva 2-Convulsão em atividade 3-Padrão respiratório ineficaz Descritor: gasping, dispneia, intenso esforço respiratório, retração intercostal, frases entrecortadas, batimento de asa de nariz ou qualquer padrão associado a cianose. 4-Saturação de O² < 92% em ar ambiente 5-Choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC: 120-140) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez, sudorese fria, alteração de nível de consciência (ansioso e/ou confuso) 6-Disfunção Orgânica Descritor: FR > 22irpm, PAS ≤ 100mmHg ou Escala de Glasgow ≤ 13 (presença de dois ou mais Sinais) 7-Alterações de glicemia Descritor: (glicemia ≤ 70 mg/dl ou ≥250mg/dl)	VERMELHO
	1-Alteração do estado mental Descritor: Uso de álcool e drogas ilícitas ou hálito etílico 2-Saturação de O² ≥ 90% e ≤ 94% em ar ambiente 3-PAS ≥ 160 e/ou PAD ≥ 110 mmHg 4-PA ≥ 140/90 mmHg com cefaleia, epigastralgia ou alterações visuais 5-Febre alta Tax: ≥ 40°C	LARANJA
	1-História de trauma 2-História de perda da consciência 3-Pacientes imunodeprimidas Descritor: Portadores de HIV; portadores de deficiência congênita de imunoglobulinas; usuários crônicos de corticoides; usuários de imunossupressores; pacientes pós-transplante de órgão sólidos e de tecido hematopoiético 4-Febre Tax: 38°C a 39,9°C	AMARELO

OUTRAS QUEIXAS/PACIENTES ENCAMINHADAS DE OUTRAS UNIDADES SEM REFERNCIAMENTO		
OUTRAS QUEIXAS/PACIENTES ENCAMINHADAS DE OUTRAS UNIDADES	1-PAS $\geq$ 160 e/ou PAD $\geq$ 110 mmHg 2-PA $\geq$ 140/90 mmHg com cefaleia e/ou epigastralgia e/ou alterações visuais 3-Vítima de Violência Sexual	LARANJA
	1-PAS de 140-159 e/ou PAD de 90-109 mmHg, assintomática 2-Dor persistente na perna que não melhora, acompanhada de edema e rigidez de musculatura da panturrilha 3-Paciente com laudo ecográfico de óbito fetal > 26 semanas de gestação 4-Pacientes imunodeprimidas Descritor: Portadores de HIV; portadores de deficiência congênita de imunoglobulinas; usuários crônicos de corticoides; usuários de imunossupressores; pacientes pós-transplante de órgão sólidos e de tecido hematopoiético	AMARELO
	1-Paciente com Exame ultrassonográfico alterado 2-Paciente com óbito fetal com idade gestacional entre 22 e 26 semanas de gestação 3-Encaminhada da UBS com ausculta negativa ou duvidosa de BCF com idade gestacional > ou igual 22 Semanas de gestação 4-Idade gestacional maior ou igual a 41 semanas 5-Referenciada para realização de CTB	VERDE
	1- Solicitação de atestados, licença maternidade e paternidade troca de pedidos de exames/receitas.	AZUL

Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco Adulto

Área (s): Diretoria de Serviços de Urgência, Apoio Diagnóstico e Cirurgias, Diretoria de Enfermagem, Diretoria de Organização de Serviços de Atenção Primária, Assessoria Técnica da Política Nacional de Humanização, Assessoria Técnica de Redes de Atenção à Saúde.

As agudizações das doenças crônicas têm impactado nos serviços de urgência e emergência, sendo estes na maioria das vezes, o ponto de acesso do usuário aos serviços especializado com exames de diagnósticos, procedimentos de alto custo, medicalização e internações, por serem serviços mais ágeis e resolutivos em situação de vulnerabilidades.

Neste sentido a classificação de risco à saúde assume o papel de estabelecer critérios de prioridade do atendimento clínico de acordo com a gravidade do caso. Possibilita a escuta qualificada e direcionamento dos usuários as clínicas especializadas.

1-Critérios de Inclusão

Todos os usuários que procurarem atendimento nas portas de urgência/emergência da Rede SES/DF

2-Critérios de Exclusão

Mulheres no ciclo gravídico puerperal com queixas relacionadas à gestação e puerpério, crianças e adolescentes até 14 anos incompletos.

ATENÇÃO: É vetado o classificador realizar encaminhamentos para outras unidades assistências. Os encaminhamentos para as UBS ou outro serviço de saúde, poderão ser realizados desde que sejam realizados pactuações nas Superintendências de Saúde de forma a garantir o acesso e atendimento do/a usuário/a pela equipe multiprofissional nesse serviço.

ALTERAÇÕES CUTÂNEAS		
ALTERAÇÕES CUTÂNEAS Feridas; abscessos; afecções da pele e subcutâneo (Cuidado com idosos e diabéticos)	1-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm 2-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria.	VERMELHO
	1-Estridor laríngeo ou dificuldade de falar Descritor: Estridor: um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior 2-Edema difuso de face Descritor: Inchaço envolvendo a derme profunda, tecido subcutâneo. Representando um edema localizado. O angiodema frequentemente ocorre na face, lábios, língua e laringe 3-Perfusão comprometida Descritor: TEC > 2 seg com sinais de cianose 4-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Com abscesso ou flutuação 5-Mordedura (humana ou animal) Descritor: Acidentes graves: Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e/ou planta do pé. Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo. Lamedura de mucosas. Lamedura de pele onde já existe lesão grave. Ferimento profundo causado por unha de animal 6-Ferida de difícil controle de sangramento Descritor: Lesão com sangramento que mesmo após compressão persiste com sangramento visível 7-Acidente com animal peçonhento com sinais e sintomas locais Descritor: Acidente ofídico, escorpiônico ou aracnídeo sem toxemia 8-Toxemiado, prostrado ou febril Descritor: Cianótico, taquicárdico, dispneico 9-Contato com produtos químicos de alta letalidade Descritor: A toxicidade aguda é a capacidade de um produto causar um efeito prejudicial após uma única exposição, em um período de tempo curto.	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa com abscesso ou flutuação 2-Ferida com sangramento controlado	AMARELO

	Descritor: Lesão com sagraimento contido após compressão 3-Abscesso e Febre (>37,8) Descritor: Resultado de uma quebra na barreira pele com contaminação bacteriana 4-Placas eritematosas de início súbito Descritor: Rubor na pele ocasionado pela vasodilatação capilar associado ou não a exposição solar, processos infecciosos ou inflamatórios, uso de substâncias medicamentosas, processos alérgicos. Quando pressionado embranquece, reaparecendo após cessar a pressão 5-Erupções secretantes ou bolhosas em mais de 10% corpo associado a prurido Descritor: Lesões com conteúdo líquido que pode ser serosidade, sangue ou pus, maior que um centímetro 6-Com infecção secundária Descritor: Presença de sinais flogísticos (dor, calor e rubor)	
	1-Mordedura (humana ou animal) Descritor: Acidentes leves, ferimentos superficiais pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e membros (exceto mãos, polpas digitais e planta dos pés). Podem acontecer em decorrência de mordeduras ou arranhaduras, causadas por unha ou dente, lambedura de pele com lesões superficiais 2-Dor leve (1-3/10) Descritor: Com abscesso ou flutuação 3-Abscesso SEM Febre Descritor: Abscesso sem flutuação 4-Ferida infectada Descritor: Sem sinais sistêmicos 5-Ferida superficial Descritor: Lesão pequena e sem sangramento	VERDE
	1-Retirada de pontos 2-Troca de curativos 3-Quadro crônico ou recorrente Descritor: Sem sinais sistêmicos 4-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

ALTERAÇÕES DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, COMPORTAMENTO OU SENSORIO

Confusão mental, ansiedade, excitação, ansiedade, letargia, obnubilação; História de ingestão de álcool e drogas; História de diabetes; Doença mental; (Cuidado com hipóxia e hipoglicemia)

ALTERAÇÕES DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, COMPORTAMENTO OU SENSORIO

1-Estado mental alterado

Descritor: Desorientado no tempo, lugar e desconhecimento de pessoas; Incapacidade de cumprir ordens simples; Pensamento desconexo

2-Respiração inadequada

Descritor: FR < 10 ou ≥ 36irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm

3-Saturação O² < 85%**4-Sinais de choque**

Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria

5-Sinais neurológicos focais

Descritor: Paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio

6-Déficit neurológico agudo

Descritor: Paresia, plegia, disfagia, afasia, ataxia, paralisia facial

7-Alterações glicêmicas

Descritor: Glicemia >250 ou <70mg/dl

VERMELHO

1-História de trauma craniano RECENTE

Descritor: História de TCE inferior a sete dias

2-História de overdose ou envenenamento

Descritor: Dosagem excessiva de medicamentos e/ou outras substâncias

3-Extrema agitação / alucinações

Descritor: Inquietação, aumento da excitabilidade psíquica, resposta exacerbada a estímulos, irritabilidade, atividade motora e verbal inadequada e repetitiva, podendo cursar com agressividade

4-Alteração de temperatura

Descritor: Temperatura: <35 ou >37,8

5-Saturação O² < 85- 89%**6-Potencial suicida / homicida**

Descritor: Presença de ideação, intenção ou planos suicidas ou homicidas

7-Dor intensa (7-10/10)

Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida

LARANJA

	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa 2-Saturação O² 90-94% 3-Vômito persistente Descritor: Reflexo incontrolável que expelle conteúdo gástrico pela boca e que não cessa com medidas para aliviar do sintoma 3-História de inconsciência Descritor: Perda da capacidade de permanecer alerta	AMARELO
	1-Saturação O² > ou = 95% 2-Vômitos esporços	VERDE

CONVULSÃO	
CONVULSÃO	1-Convulsão ativa Descritor: Contratura muscular involuntária de todo o corpo ou de parte dele 2-Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução, deslocamento da mesma) 3-Alterações glicêmicas Descritor: Glicemia >250 ou <70mg/dl 4-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm 5-Sinais neurológicos focais Descritor: Paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio 6-Crise convulsiva re-entrante Descritor: Crise repetida sem a recuperação completa da consciência entre elas 7-Sinais meningismo Descritor: Rigidez na nuca e sinais radiculares <i>Lasègue</i> e <i>Kernig</i>
	VERMELHO
	1-História overdose ou envenenamento Descritor: Dosagem excessiva de medicamentos e/ou outras substâncias 2-História de trauma craniano RECENTE Descritor: História de TCE inferior a sete dias
	LARANJA
	1-Em pós-comicial Descritor: Momento posterior a crise convulsiva que pode se caracterizar por perda da consciência, confusão ou desorientação mental e letargia 2-História de epilepsia em tratamento Descritor: Histórico pessoal de epilepsia em uso de anticonvulsivante 3-Crise convulsiva há menos de 12h e alerta Descritor: Relato de crise convulsiva nas últimas 12 horas
	AMARELO
	1-Nenhum dos determinantes anteriores
	VERDE

	7-Alteração de temperatura Descritor: Temperatura: <35°C ou >37,8°C. 8-História importante de alergia Descritor: Relato de reação alérgica conhecida. 9-Cefaléia intensa (8-10/10) de início súbito Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como "A pior dor de cabeça da vida". 9-História de trauma craniano RECENTE Descritor: História de TCE inferior a sete dias.	
	1-História de inconsciência Descritor: Perda da capacidade de permanecer alerta. 2-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 3-Em pós-comicial Descritor: Momento posterior a crise convulsiva que pode se caracterizar por perda da consciência. 4-Relato de primeira crise convulsiva 5-Relato de crise convulsiva há menos de 12h e alerta Descritor: Relato de crise convulsiva nas últimas 12 horas.	AMARELO
	1-Dor leve (1-3/10) 2-Parestesias bilaterais ou migratórias Descritor: Sensações cutâneas subjetivas (ex., frio, calor, formigamento, pressão) que são percebidas espontaneamente na ausência de estimulação.	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anterior	AZUL

DIARRÉIA E VÔMITOS		
DIARRÉIA E VÔMITOS Pacientes idosos imunossuprimidos	1-Vômito com sangue Descritor: Presença de grande quantidade de sangue no vômito presenciado ou relatado com repercussão hemodinâmica, Hipotensão (PA sistólica $\leq 80\text{mmHg}$); Taquicardia (FC $\geq 140\text{bpm}$) ou Bradicardia (FC $\leq 40\text{bpm}$) 2-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica $\leq 80\text{mmHg}$), Taquicardia (FC $\geq 140\text{bpm}$) ou Bradicardia (FC $\leq 40\text{bpm}$), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria.	VERMELHO
	1-Dor Intensa Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 2-Alteração do nível de consciência Descritor: Escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-13). 3-Perfusão comprometida Descritor: TEC > 2 seg com sinais de cianose.	LARANJA
	1-Alteração de temperatura Descritor: Temperatura: $<35^{\circ}\text{C}$ ou $>37,8^{\circ}\text{C}$. 2-Fezes enegrecidas ou em geléia de groselha Descritor: Presença sangue fresco com coágulos nas fezes. 3-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 4-Sinais de desidratação Descritor: Diminuição da urina e da turgidez da pele (a pele demora para voltar ao lugar, se esticada), fraqueza e tonturas, boca e língua secas.	AMARELO
	1-Dor leve (1-3/10) 2-Vômitos esporços 3-Evento de início < 6 horas	VERDE
	1- Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

DOR ABDOMINAL OU QUEIXAS ABDOMINAIS (Cuidado com pacientes idosos, diabéticos, pacientes com passado de IAM com dor em abdome superior e mulheres em idade fértil)	
1-Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução ou deslocamento da mesma). 2-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm. 3-Sinais de Choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 4-Vômito com sangue Descritor: Presença de grande quantidade de sangue no vômito presenciado ou relatado com repercussão hemodinâmica, Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg); Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm).	VERMELHO
1-Dor irradiando para o dorso 2-Dor epigástrica 3-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 4-Alteração de temperatura Descritor: Temperatura: <35°C ou >37,8°C.	LARANJA
1-Fezes enegrecidas ou em geléia de groselha Descritor: Presença sangue fresco com coágulos nas fezes. 2-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 3-História de vômito COM sangue < 6 HORAS 4-Sangramento vaginal 5-Possível gravidez 6-Irradiação para ombro 7-Vômito persistente	AMARELO

	Descritor: Reflexo incontrolável que expelle conteúdo gástrico pela boca e que não cessa com medidas para aliviar o sintoma.	
	1-Dor leve (1-3/10) 2-Parestesias bilaterais ou migratórias Descritor: Sensações cutâneas subjetivas (ex., frio, calor, formigamento, pressão) que são percebidas espontaneamente na ausência de estimulação.	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

DOR CERVICAL	
DOR CERVICAL	1-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm. 2-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 3-Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução ou deslocamento da mesma). 4-Sinais neurológicos focais Descritor: Paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. 5-Manifestações hemorrágicas Descritor: Presença de petéquias, equimoses, sangramentos espontâneos.
	VERMELHO
	1-Alteração do nível de consciência Descritor: Escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-13). 2-Sinais de meningismo Descritor: Rigidez na nuca e sinais radiculares <i>Lasègue</i> e <i>Kernig</i>. 3-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 4-Alteração de temperatura Descritor: Temperatura: <35°C ou >37,8°C. 5-Trauma direto no pescoço Descritor: Inclui traumatismos de garganta, nuca e região supraclavicular.
	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa com abscesso ou flutuação
	AMARELO
	1-Evento recente < 7 dias Descritor: Aparecimento <7 dias.
	VERDE

	2-Dor leve (1-3/10)	
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

DOR DE CABEÇA		
DOR DE CABEÇA	1-Estado mental alterado Descritor: Desorientado no tempo, lugar e desconhecimento de pessoas; Incapacidade de cumprir ordens simples; Pensamento desconexos; Rebaixamento do nível de consciência, letargia e/ou confusão mental. 2-Convulsão ativa Descritor: Contratura muscular involuntária de todo o corpo ou de parte dele. 4-Sinais neurológicos focais Descritor: Paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. 5-Sinais meningismo Descritor: Rigidez na nuca e sinais radiculares <i>Lasègue e Kernig</i>. 6-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 7-Início súbito de maior intensidade já sentida Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como "A pior dor de cabeça da vida". 8-Perda aguda completa da visão	VERMELHO
	1-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.	LARANJA
	1-História de inconsciência Descritor: Perda da capacidade de permanecer alerta 2-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa 3-Alteração de temperatura Descritor: Temperatura: $<35^{\circ}\text{C}$ ou $>37,8^{\circ}\text{C}$ 4-Náuseas e vômitos Descritor: Associados a dor 5-Diminuição recente da visão	AMARELO
	1-Evento recente < 7 dias Descritor: Aparecimento <7 dias	VERDE

	2-Dor leve (1-3/10)	
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

DOR DE GARGANTA	DOR DE GARGANTA	
	1-Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução ou deslocamento da mesma).	VERMELHO
	1-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 2-Estridor laríngeo ou dificuldade de falar Descritor: Estridor: um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior.	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 2-Alteração de temperatura Descritor: Temperatura: <35°C ou >37,8°C. 3-História de viagem recente	AMARELO
	1-Dificuldade para deglutir 2-Ardencia na garganta sem sialorreia 3-Tosse, coriza, obstrução 4-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável.	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

DOR NA COLUNA E EM EXTREMIDADES		
DOR NA COLUNA E EM EXTREMIDADE (Cuidado com idosos e diabéticos, diminuição da temperatura distal, diminuição ou ausência de pulso distal)	1-Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução ou deslocamento da mesma). 2-Sinais neurológicos focais Descritor: Paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. 3-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 4-Sinais de isquemia VERMELHO	
	1-Sinais flogísticos ou com drenagem em articulação Descritor: Edema, hiperemia, calor e rubor. 2-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 3-Alteração de temperatura Descritor: Temperatura: <35 ou >37,8. 4-Comprometimento vascular distal 5-Grave mecanismo de trauma Descritor: Desaceleração frontal rápida; desaceleração vertical rápida; penetração de projétil. LARANJA	
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 2-Dificuldade de andar 3-Sem sinais de isquemia 4-Sinais flogísticos locais não articulares Descritor: Edema, hiperemia, calor e rubor. 5-Limitação dos movimentos/função AMARELO	
	1-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável. VERDE	

	2-Edema articular sem flogose Descritor: Flogose é uma resposta do organismo ao agente agressor, caracterizado pela saída de líquidos e de células do sangue para o interstício. 3-Evento recente Descritor: Aparecimento < 7 dias. 4-Limitação leve dos movimentos sem perda da função	
	1-Dor crônica não agudizada 2-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

DOR TORÁCICA (Avaliar intensidade da dor, dados vitais, se espontânea ou traumática, duração característica, localização, irradiação e uso de medicamentos)	DOR TORÁCICA	
	1-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm. 2-Dor precordial Descritor: Dor intensa em aperto ou peso no meio do peito, irradiando para o braço esquerdo, pescoço ou mandíbula. Pode-se associar sudorese e náuseas. 3-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 4-Trauma penetrante	VERMELHO
	1-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 2-Hemoptise ativa Descritor: Sangramento ativo vermelho vivo em quantidade maior que uma colher de chá. 3-Trauma torácico com falta de ar 4-Pulso anormal (FILIFORME) Descritor: Tipo de pulso arterial muito fraco.	LARANJA
	1-História cardíaca importante 2-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 3-Dor pleurítica Descritor: Dor aguda provocada pela irritação do revestimento dos pulmões – torna-se mais intensa com a respiração profunda e com a tosse. 4-Epistaxe Descritor: Sangramento ativo controlado por compressão direta. 5-Vômito persistente	AMARELO
	1-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável.	VERDE

	2-Dor que piora ao movimento Descritor: Dor de característica muscular (localizada, evidenciada à palpação, que piora com movimentos do tronco ou membros superiores) 3-Dificuldade para deglutir 4-Tosse produtiva	
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS (Envenenamentos e intoxicações)

(Cuidado com ingestão de anticonvulsivantes, antidepressivos, sulfato ferroso, paracetamol, antihipertensivos, antiarrítmicos, antiabaloqueadores, digoxina, hipoglicemiante oral, organofosforados, carbamatos e Drogas não conhecidas)

EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS

1-Estado mental alterado

Descritor: Desorientado no tempo, lugar e desconhecimento de pessoas; Incapacidade de cumprir ordens simples; Pensamento desconexos; rebaixamento do nível de consciência, letargia e/ou confusão mental.

2-Respiração inadequada

Descritor: FR < 10 ou ≥ 36irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm.

3-Saturação O² < 85%**4-Edema facial****5-Edema de língua****6-Sinais de choque**

Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria.

7-Convulsão ativa

Descritor: Contratura muscular involuntária de todo o corpo ou de parte dele.

8-Risco de contaminação contínua**9-Lesão ocular química aguda**

VERMELHO

1-Ingestão há menos de 6h sem sintomas**2-Substância de alto risco de intoxicação****3-Saturação O² < 85-89%****4-Dor intensa (7-10/10)**

Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.

5-História de inconsciência**6-Estridor laríngeo ou dificuldade de falar**

Descritor: Estridor é um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior.

7-História psiquiátrica importante**8-Acidente perfuro-cortante com material biológico**

LARANJA

	1-Prurido e/ou irritação intensa 2-Saturação O² 90-94% 3-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa.	AMARELO
	1-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável. 2-Saturação O² > ou = 95% 3-Alterações dérmicas locais	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

MORDEDURAS E PICADAS DE ANIMAIS

MORDEDURAS E PICADAS DE ANIMAIS

1-Hemorragia sem controle ou lesão de grandes vasos ou hemorragia grave

Descritor: Lesões com sangramento visível a despeito de medidas compressivas em jatos ou esguichos de sangue. Perda ≥ 1.500 ml (um lençol encharcado abruptamente); FC ≥ 120 bpm e PAS ≤ 70 mmHg.

2-Comprometimento/obstrução de vias aéreas

Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução ou deslocamento da mesma).

3-Respiração inadequada

Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.

4-Sinais de choque

Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg), taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria.

5-Saturação O₂ $< 85\%$

6-Saturação de oxigênio $< 95\%$ com O₂ e $< 90\%$ em ar ambiente

VERMELHO

1-Alteração do nível de consciência

Descritor: Escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-13).

2-Estridor laríngeo ou dificuldade de falar

Descritor: Estridor é um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior.

3-Edema de face

4-Edema de língua

Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); Taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40 bpm).

4-Saturação O₂ 85-89%

5-Ferimentos profundos

6-Dor intensa (7-10/10)

Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.

7-História importante de alergia

8-Veneno alta mortalidade

LARANJA

	1-Sem sinais sistêmicos 2-Eritema ou bolhas disseminadas 3-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 4-Saturação O² 90-94% 5-Prurido intenso 6-Ferida com sangramento controlado Descritor: Lesão com sangramento contido após compressão.	AMARELO
	1-Saturação O² > ou = 95% 2-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável. 3-Inflamação local Descritor: Edema, hiperemia, calor e rubor. 4-Infecção local	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

MAL-ESTAR GERAL	
MAL-ESTAR GERAL Realizar teste de glicemia (Observar Protocolo de Atenção Integral à Pessoa com Hemofilias A e B)	1-Hipoglicemia grave Descritor: Glicemia < 50mg/dL e sinais: mudança de comportamento (agressividade, apatia, perda de consciência, crise convulsiva), sudorese intensa e necessidade de ajuda de terceiros. 2-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm. 3-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 4-Sinais neurológicos focais Descritor: Paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. 5-Sinais de meningismo Descritor: Rigidez na nuca e sinais radiculares <i>Lasègue</i> e <i>Kernig</i>. VERMELHO
	1-Alteração do nível de consciência Escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-13). 2-Dor intensa (7-10/10) Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. LARANJA
	1-Petéquias e/ou equimoses 2-Sudorese fria 3-Sinais vitais alterados Descritor: PAS > 220 ou PAD >130 mmHg; PAS > 80 mmHg; FC < 40 ou >150 bpm; FR < 10 ou > 36 ipm. 4-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 5-Bolhas ou manchas disseminadas 6-Imunossupressão conhecida 7-História hematológica importante AMARELO
	1-Alteração de temperatura Descritor: Temperatura <35°C ou >37,8°C. VERDE

	2-Evento recente de viagem para regiões endêmicas Descritor: Intervalo < 7 dias 3-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável.	
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

PALPITAÇÕES (batedeiras)	
1-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm. 2-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 3-Dor torácica Descritor: Paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio.	VERMELHO
1-Dispneia aguda Descritor: Sensação de dificuldade para respirar de instalação súbita (<30 dias). 2-Pulso anormal (FILIFORME) Descritor: Tipo de pulso arterial muito fraco. 3-Dor intensa Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 4-História de overdose ou envenenamento Descritor: Dosagem excessiva de medicamentos e/ou outras substâncias.	LARANJA
1-Palpitação no momento 2-História cardíaca importante 3-História de inconsciência Descritor: Perda da capacidade de permanecer alerta.	AMARELO
1-Evento recente	VERDE
1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

PALPITAÇÕES (batedeira)
Realizar eletrocardiograma ou Oximetria

POLITRAUMAS

Traumatismo crânio encefálico, agressão, grave mecanismo de trauma, lesão grave de únicos ou múltiplos sistemas, TCE com EC Glasgow ≤ 8 , grande queimado (SCQ > 26%) ou acometimento de vias aéreas (síndrome de inalação), trauma tóraco abdominal com perfuração, taquidispnéia, alteração mental, hipotensão, taquicardia e dor intensa, lesão múltiplas de membros com desalinhamento

POLITRAUMAS**1-Sinais de choque**

Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg), taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40 bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria.

2-Comprometimento/obstrução de vias aéreas

Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução, deslocamento da mesma).

3-Hemorragia sem controle ou lesão de grandes vasos ou hemorragia grave

Descritor: Lesões com sangramento visível a despeito de medidas compressivas em jatos ou esguichos de sangue. Perda ≥ 1.500 ml (um lençol encharcado abruptamente); FC ≥ 120 bpm e PAS ≤ 70 mmHg.

4-Amputação traumática**5- Sinais neurológicos focais****6-Otorragia****VERMELHO****1-Alteração do nível de consciência**

Descritor: Escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-13).

2-Palidez cutânea e sudorese fria dor pleurítica

Descritor: Dor aguda provocada pela irritação do revestimento dos pulmões – torna-se mais intensa com a respiração profunda e com a tosse.

3-Dor cervical**4-Dor intensa (7-10/10)**

Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.

5-Dor ou instabilidade da pelve**6-Náuseas / vômitos****7- Evisceração**

Descritor: É uma lesão onde ocorre a extrusão de vísceras abdominais.

8-Ferimento perfurante**9-Trauma direto no pescoço****LARANJA**

	1-Envolvimento em mecanismo de trauma grave Descritor: Queda de altura; acidente automobilístico; acidente com motocicleta, atropelamento de pedestre ou ciclista. 2-História de inconsciência Descritor: Perda da capacidade de permanecer alerta. 3-Hemorragia controlável Descritor: Sangramento ativo contido por compressão. 4-Cefaléia moderada (4-7/10) Descritor: Sem perda de consciência, náuseas, vômitos, crise convulsiva ou ferimento perfurante. 5-Cefaléia pós alta 6-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa.	AMARELO
	1-Contusões e escoriações 2-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável. 3-Evento recente 4-Evento (trauma) há mais de 6h 5-Edema local 6-Deformidade local sem lesões	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

QUEIMADURAS		
QUEIMADURAS Realizar o 1º atendimento e encaminhar para o HRAN, seguindo o protocolo clínico, quando necessário	1-Estado mental alterado Descritor: Desorientado no tempo, lugar e desconhecimento de pessoas; Incapacidade de cumprir ordens simples; Pensamento desconexos; rebaixamento do nível de consciência, letargia e/ou confusão mental 2-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm 3-Saturação O² < 85 % Descritor: Saturação de oxigênio < 95% com O ₂ e < 90% em ar ambiente	VERMELHO
	1-Queimaduras circunferenciais 2-Queimaduras de 2º/3º grau > 10% SCQ Descritor: >10 e 25% SCQ 3-Queimaduras de 2º/3º grau em face e períneo 4-Queimaduras elétricas 5-Queimaduras em ambientes confinados 6-Saturação O² 85-89% 7-Estridor laríngeo ou dificuldade de falar Descritor: Estridor é um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior	LARANJA
	1-Queimaduras de 2º/3º grau < 10% SCQ 2-Queimaduras de 1º grau > 10% SCQ Descritor: > 10% SCQ em áreas não críticas 3-Queimaduras de 1º grau em face e períneo 4-Queimaduras de mãos e pés de qualquer grau 5-Saturação O² 90-94%	AMARELO
	1-Saturação O² > ou = 95 % 2-Queimaduras de 1º grau Descritor: <10% SCQ em áreas não críticas	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

QUEIXAS OCULARES	QUEIXAS OCULARES	
	1-Dados vitais alterados Descritor: PAS $\geq$ 220 ou PAD $\geq$ 130 mmHg; PAS $\leq$ 80mmHg; FC $\leq$ 40 ou $\geq$ 150bpm; FR $\leq$ 10 ou $\geq$ 36irpm; Febre $>$ 40°C em adultos; Febre (T. axilar $\geq$ 38,5°C) em imunocomprometidos; PAS entre 190-220 / PAD entre 120-130mmHg; Febre (T. axilar $\geq$ 38,5°C) em imunocompetentes e com toxemia. 2-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 3-Perda visual súbita ou diplopia	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 2-Celulite peri-orbitária	AMARELO
	1-Dor leve (1-3/10) 2-Sensação de corpo estranho 3-Hemorragia na esclera Descritor: Sem história de trauma. 4-Olho avermelhado Descritor: Sem história de trauma, contatato com substâncias químicas ou solda. 5-Prurido ocular 6-Terçol ou calázio	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

QUEIXAS OTOLÓGICAS		
QUEIXAS OTOLÓGICAS	1-Alteração do estado mental Descritor: Confusão mental, agitação, delírio. 2-Otorragia Descritor: Sangramento pelo conduto auditivo externo. 3-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa.	AMARELO
	1-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável. 2-Perda recente da audição 3-Zumbidos 4-Presença de corpo estranho	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

QUEIXAS RESPIRATÓRIAS		
QUEIXAS RESPIRATÓRIAS Falta de ar, obstrução nasal, tosse história de asma (cuidado com o uso crônico de corticóide, idosos, história de internação frequente ou internação em UTI)	1-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica $\leq 80\text{mmHg}$), Taquicardia (FC $\geq 140\text{bpm}$) ou Bradicardia (FC $\leq 40\text{bpm}$), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 2-Início agudo após trauma 3-Exaustão Descritor: Apresentando tiragem intercostal. 4-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou $\geq 36\text{irpm}$ com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou $\geq 150\text{bpm}$. 5-Respiração inadequada 6-Saturação $\text{O}^2 < 85\%$ 7-Uso inadequado da musculatura acessória	VERMELHO
	1-Alteração do estado mental Descritor: Confusão mental, agitação, delírios. 2-Dor cardíaca Descritor: Dor intensa em aperto ou peso no meio do peito, irradiando para o braço esquerdo ou pescoço. Pode-se associar sudorese e náuseas. 3-Incapacidade de falar sentenças 4-Estridor laríngeo ou dificuldade de falar Descritor: Estridor é um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior. 5-Frequência cardíaca irregular ou alterada 6-Saturação $\text{O}^2 < 85-89\%$ 7-História respiratória importante Descritor: Internação hospitalar anterior por problema respiratório.	LARANJA
	1-Saturação $\text{O}^2 90-94\%$ 2-Alteração de temperatura Descritor: Temperatura $< 35^\circ\text{C}$ ou $> 37,5^\circ\text{C}$.	AMARELO

	1-Dor de garganta 2-Tosse produtiva 3-Saturação O² > ou = 95% 4-Evento recente Descritor: Aparecimento < 7 dias. 5-História de chieira noturna	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

QUEIXAS URINÁRIAS / DOR TESTICULAR		
QUEIXAS URINÁRIAS	1-Prostração, palidez cutânea ou sudorese 2-Dor escrotal aguda 3-Priapismo Descritor: Ereção peniana dolorosa. 4-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 5-Hematúria Descritor: Urina escurecida, avermelhada ou com coágulos de sangue. 6-Gangrena escroto 7-Celulite de escroto 8-Retenção urinária aguda com bexigoma <td>LARANJA</td>	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 2-Disúria intensa com polaciúria e/ou hematúria 3-Alteração de temperatura (<35 ou >37,8°C) 4-Vômito persistente Descritor: Reflexo incontrolável que expelle conteúdo gástrico pela boca e que não cessa com medidas para aliviar do sintoma. <td>AMARELO</td>	AMARELO
	1-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável. 2-Trauma superficial de escroto 3-Corrimento uretral amarelado e fétido 4-Troca de sonda obstruída 5-Evento recente < 7 DIAS <td>VERDE</td>	VERDE
	1-Troca de sonda 2-Nenhum dos determinantes anteriores <td>AZUL</td>	AZUL

SANGRAMENTOS		
SANGRAMENTOS hematótese hemoptise, melena, epistaxe, metorragia ((uidado com cirróticos, usuários de anticoagulantes, portadores de coagulopatias e grávidas))	1-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica $\leq 80\text{mmHg}$), Taquicardia (FC $\geq 140\text{bpm}$) ou Bradicardia (FC $\leq 40\text{bpm}$), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 2-Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução ou deslocamento da mesma). 3-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou $\geq 36\text{irpm}$ com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou $\geq 150\text{bpm}$. 4-Distúrbio de coagulação Descritor: Pacientes hemofílicos. 5-Hemorragia sem controle ou lesão de grandes vasos ou hemorragia grave Descritor: Lesões com sangramento visível a despeito de medidas compressivas em jatos ou esguichos de sangue. Perda $\geq 1.500\text{ ml}$ (um lençol encharcado abruptamente); FC $\geq 120\text{ bpm}$ e PAS $\leq 70\text{ mmHg}$ e/ou pacientes sob o uso de anticoagulantes. 6-Distúrbio de coagulação de paciente cardiopata em uso de anticoagulante	VERMELHO
	1-Epistaxe SEM CONTROLE COM TAMPONAMENTO 2-Evacuação de sangue vivo ou alterado 3-História importante de sangramento digestivo 4-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 5-Alteração do nível de consciência Descritor: Escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-13). 6-Vômito de sangue	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 2-Fezes enegrecidas ou em geléia de groselha	AMARELO

	Descritor: Presença sangue fresco com coágulos nas fezes. 3-Sangramento vaginal Descritor: Com uso de mais ou menos oito absorventes dia porem com sinais vitais estáveis. 4-Vômito persistente Descritor: Reflexo incontrolável que expelle conteúdo gástrico pela boca e que não cessa com medidas para aliviar do sintoma.	
	1-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável. 2-Relato de hemorróidas Descritor: Com dor leve, sem sangramento. 3-Relato de epistaxe 4-Evento recente Descritor: Aparecimento < 7 dias.	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

TRAUMATISMO TORACOABDOMINAL		
TRAUMATISMO TORACOABDOMINAL	1-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80mmHg), Taquicardia (FC ≥ 140bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 2-Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução ou deslocamento da mesma). 3-Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm. 4-Hemorragia sem controle ou lesão de grandes vasos ou hemorragia grave Descritor: Lesões com sangramento visível a despeito de medidas compressivas em jatos ou esguichos de sangue. Perda ≥ 1.500 ml (um lençol encharcado abruptamente); FC ≥ 120 bpm e PAS ≤ 70 mmHg e/ou pacientes sob o uso de anticoagulantes.	VERMELHO
	1-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 2-Alteração do nível de consciência Descritor: Escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-13). 3-Dispneia aguda Descritor: Sensação de dificuldade para respirar de instalação súbita (<30 dias). 4-Evisceração Descritor: É uma lesão onde ocorre a extrusão de vísceras abdominais. 5-Grave mecanismo de trauma Descritor: Desaceleração frontal rápida; desaceleração vertical rápida; penetração de projétil.	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 2-Hemorragia controlável Descritor: Sangramento ativo contido por compressão.	AMARELO

	1-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável. 2-Evento recente Descritor: Aparecimento < 7 dias. 3-Infecção loca 4-Inflamação local Descritor: Edema, hiperemia, calor e rubor.	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

TRAUMAS Agressão, luxação, entorse, fratura exposta/amputação, fratura fechada, contusões	TRAUMAS	
	1-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica $\leq$ 80mmHg), Taquicardia (FC $\geq$ 140bpm) ou Bradicardia (FC $\leq$ 40bpm), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída, irritabilidade, alteração do nível de consciência e oligúria. 2-Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios, presença de secreção, sangue, corpo estranho, edema de lábio ou língua, em uso de traqueostomia (obstrução ou deslocamento da mesma). 3-Sinais de isquemia 4-Fratura exposta 5-Sinais neurológicos focais Descritor: Paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio.	VERMELHO
	1-Dor intensa (7-10/10) Descritor: Dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 2-Ferida com sangramento ativo 3-Edema (++ / 4 +) 4-Alterações Respiratórias Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm. 5-Incapacidade de andar 6-Grave mecanismo de trauma Descritor: Desaceleração frontal rápida; desaceleração vertical rápida; penetração de projétil.	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6/10) Descritor: Dor suportável, mas intensa. 2-Ferimento sem sangramento ativo 4-Deformidade em membros 5-Cefaléia 6-Vômito Descritor: Se não se puder excluir trauma craniano, ingestão de drogas ou doença de base.	AMARELO

	7-Sem sinais de isquemia 8-Sinais flogísticos locais Descritor: Edema, hiperemia, calor e rubor. 9-Limitação dos movimentos/função	
	1-Dor leve (1-3/10) Descritor: Dor suportável. 2-Evento recente Descritor: Aparecimento < 7 dias. 4-Edema articular sem flogose 5-Limitação leve dos movimentos 6-Sem perda da função	VERDE
	1-Dor crônica não agudizada	AZUL

SITUAÇÕES ESPECIAIS		
SITUAÇÕES ESPECIAIS	1-Alterações de temperatura durante hemodiálise ou transplantados ou em uso de imunossupressor Descritor: Temperatura <35°C ou >37,5°C. 2-Troca de traqueostomia Descritor: Deslocamento ou retirada involuntária da traqueostomia com desconforto respiratório grave. 3-Violência sexual e/ou intrafamiliar 4-Paciente com doença falciforme Descritor: Priapismo, dor torácica aguda, dor abdominal aguda, alterações neurológicas agudas, saturação $\leq 90\%$. 5-Exposição sexual consentida 6-Pacientes escoltados 7-Assistidos pelo NRAD 8-Incidente perfurante com material biológico 9-Suspeita clínica/epidemiológica de Dengue com sinais de gravidade Descritor: Sinais de gravidade: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico), hipotensão postural e/ou lipotímia, hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia e/ou irritabilidade. 10-Trauma em paciente Hemofílico 11-Retorno em período < 24 horas por ausência de melhora	LARANJA

DADOS VITAIS ALTERADOS		
DADOS VITAIS ALTERADOS	1-PAS ≥ 220 ou PAD ≥ 130mmHg 2-PAS ≤ 80mmHg 3-FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm 4-FR ≤ 10 ou ≥ 36irpm 5-Febre $> 40^{\circ}\text{C}$ em adultos 6-Febre (T. axilar $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) em imunocomprometidos	VERMELHO
	1-PAS entre 190-220 / PAD entre 120-130mmHg Descritor: Acompanhado de outros sinais e sintomas. 2-Febre (T. axilar $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) em imunocompetentes e com toxemia Descritor: Cianótico, taquicárdico, dispnéico. 3-PAS entre 190-220 Descritor: Sem outros sintomas. 4-PAD entre 120-130mmHg Descritor: Sem outros sintomas. 5-Febre (T. axilar $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) em imunocompetentes e sem sem toxemia	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores	AZUL

Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco em Pediatria

Área (s): Referência Técnica Distrital de Pediatria, Diretoria de Serviços de Urgências, Apoio Diagnóstico e Cirurgias, Diretoria de Enfermagem, Diretoria de Organização de Serviços de Atenção Primária/, Diretoria de Áreas Estratégicas da Atenção Primária, Assessoria da Política Nacional de Humanização, Assessoria de Redes de Atenção à Saúde

Os serviços de atendimento em urgência e emergência pediátrica apresenta uma enorme demanda por atendimento sendo uma realidade presente em todo o país. A estratificação de risco facilita a gestão da pediatria e do serviço como um todo, oferecendo uma atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada do usuário ao serviço

A criança deve ser classificada por tipo e gravidade de suas condições clínicas. Essa categorização fundamenta-se nas informações colhidas durante toda a avaliação, e permite aplicação da terapêutica ideal.

1-Critérios de Inclusão

- Crianças e adolescentes até 13 anos, 11 meses e 29 dias; e
- pacientes com doença hematológica crônica até 17 anos, 11 meses e 29 dias, e
- pacientes com transtornos mentais com ou sem dependência química até 11 anos, 11 meses e 29 dias (conforme Portaria 536/2018); e que procurarem atendimento nas portas de urgência/emergência pediátrica da Rede SES/DF.

2-Critérios de Exclusão

Adultos e adolescentes a partir de 12 anos com transtornos mentais com ou sem dependência química, adolescentes a partir de 14 anos, exceto pacientes com doença hematológica crônica até 17 anos, 11 meses e 29 dias.

ATENÇÃO: É vetado o classificador realizar encaminhamentos para outras unidades assistências. Os encaminhamentos para as UBS ou outro serviço de saúde, poderão ser realizados desde que sejam realizados pactuações nas Superintendências de Saúde de forma a garantir o acesso e atendimento do/a usuário/a pela equipe multiprofissional nesse serviço.

**TOSSE; FALTA DE AR; DIFICULDADE PARA RESPIRAR; RESPIRAÇÃO RUIDOSA; CHIADO NO PEITO;
OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS**

TOSSE; FALTA DE AR; DIFICULDADE PARA RESPIRAR; RESPIRAÇÃO RUIDOSA; CHIADO NO PEITO; OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS

1-PCR, bradicardia importante ou PCR iminente

Descritor: Ausência de reação; crise convulsiva; dificuldade ou ausência de respiração; ausência de sons cardíacos; ausência de movimento torácico; pele fria e azulada; ausência de pulso carotídeo, braquial ou femoral; bradicardia (vide tabela de referência anexa); taquipneia ou bradipneia; alteração do nível de consciência.

2-Apneia, bradipneia, ou movimentos toracoabdominais paradoxais

Descritor: Interrupção da respiração por 20 segundos, ou por qualquer tempo, quando associada a alteração na cor, tônus musculares ou frequência cardíaca.

3-Via aérea obstruída

Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios; edema de lábio ou língua; em uso de traqueostomia (obstrução, deslocamento da mesma) ou obstrução por ingestão de corpo estranho.

4-Cianose central

Descritor: Língua, mucosas orais e pele azuladas ou roxas; ocorre devido problemas no coração ou no pulmão; o sangue já chega desoxigenado aos capilares por falta de oxigenação do sangue nos pulmões.

5-Paciente não responde, Glasgow < 8

Descritor: Ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso; agitação psicomotora ou sinais focais.

6-Falência respiratória ou SpO² < 85%

Descritor: Sudorese; fadiga; chiado; diminuição ou ausência de MV; BAN; retrações intercostais ou subcostais; taquipneia; apneia; bradipneia; dispneia ou cianose; hipoxemia (<85%).

VERMELHO

1-Estridor laríngeo e dificuldade de falar ou mamar

Descritor: Inspiração ruidosa ou difícil; respiração prejudicada pela fala ou durante a sucção ao mamar.

2-Edema labial e/ou de língua com sensação de garganta fechando

Descritor: Início súbito associado a ingestão de alimentos ou medicamentos com histórico de alergia, ou exposição a inalantes.

3-Dispneia moderada ou intensa

Descritor: Dispneia; BAN; tiragens subcostais; gemência; histórico de asma quase fatal; fatores de risco: internações prévias por crise grave de asma, com necessidade de intubação e ventilação, sem acompanhamento profilático.

4-Lactente dispneico com recusa ou dificuldade para se alimentar

LARANJA

	Descritor: Estridor; gemidos; sibilância; períodos de apneia ou guinchos; respiração rápida ou difícil, associada a dificuldade para ingerir alimentos líquidos ou sólidos. 5-SpO² de 85-90% 6-Epistaxe com instabilidade hemodinâmica Descritor: Taquicardia 7-Salivação excessiva Descritor: Salivação excessiva associada a desconforto respiratório. 8-Hemoptise franca 9-Temperatura < 35°C ou ≥ 38,5°C até 3 meses de idade; Temperatura ≥ 39,5°C > 3 meses de idade	
	1-Taquipneia Descritor: FR > 60 irpm até 2 meses; > 50 irpm de 2 a 12 meses; > 40 irpm de 13 meses a 5 anos; > 30 irpm de 6 a 8 anos e > 25 irpm > de 8 anos. 2-Dispneia leve Descritor: Incursões respiratórias de esforço leve; tiragens intercostais. 3-SpO² de 91- 94% 4-Tosse frequente emetizante Descritor: Acessos de tosse seca espasmódica que culmina em vômito; sem estridor e sem dificuldade respiratória. 5-Temperatura de 37,8°C a 38,4°C até 3 meses de idade; Temperatura de 38,5°C a 39,4°C > 3 meses de idade	AMARELO
	1-Dor de garganta Descritor: Tosse sem desconforto respiratório; mau hálito e mal-estar e odinofagia. 2-Dor de ouvido Descritor: Tosse seca ou úmida; associada a dor de ouvido, mas sem sinais de acometimento sistêmico. 3-Rinorreia purulenta Descritor: Secreção nasal amarelo esverdeada; obstrução nasal e espirros sem sinais de acometimento sistêmico. 4-Temperatura entre 37,5°C e 38,4°C > 3 meses de idade Descritor: Tosse seca ou úmida; associada a febre baixa, mas sem sinais de acometimento sistêmico. 5-Dor muscular Descritor: Sintomas respiratórios leves com relato ou sinais de dor muscular.	VERDE

	6-SpO ² ≥ 95%	
	1-Coriza Descritor: Apenas coriza sem sinais sistêmicos.	AZUL

Alterações no nível de consciência e sensorio, paresias e paralisias. Medir glicemia

Alterações no nível de consciência e sensorio, paresias e paralisias. Medir glicemia

1-Apneia, bradipneia, ou movimentos toracoabdominais paradoxais

Descritor: Interrupção da respiração por 20 segundos, ou por qualquer tempo; quando associada a alteração na cor, tônus musculares ou frequência cardíaca; com dificuldade respiratória; sialorreia intensa; estridor; voz abafada e cianose.

2-Convulsão em atividade

Descritor: Crise convulsiva à admissão.

3-Paciente não responde; Glasgow < 8

Descritor: Ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso; agitação psicomotora ou sinais focais.

4-Sinais de choque

Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oliguria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10 anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg.

5-Glicemia < 50 mg/dl em crianças

Descritor: Glicemia < 50 mg/dl em crianças

6-Glicemia > 200 mg/dl

Descritor: Glicemia > 200 mg/dl

VERMELHO

1-Extrema agitação; choro inconsolável

Descritor: Inquietação; resposta exacerbada à estímulos; irritabilidade; choro incessante.

2-Vômitos incoercíveis

Descritor: Vômitos que não cessam mesmo após medidas para alívio ou não tem intervalo entre os episódios; 5 ou mais episódios de vômito na última hora.

3-SpO2 de 85-90%

Descritor: Saturação O₂ ≤ 90%.

4-Estado pós ictal ou déficit focal agudo

Descritor: História de convulsão na última hora associada a um dos seguintes sinais: sonolência; liberação de esfíncteres (urinou ou evacuou nas roupas); hipersecreção; miose ou sibilância e broncoespasmo.

5-Alteração de temperatura (< 35°C ou > 40°C)

Descritor: Temperatura < 35°C ou > 40°C.

6-Deficiência neurológica AGUDA

Descritor: Déficit motor (paresia ou paralisia) nas últimas 24 horas.

LARANJA

	7-Tentativa de autoextermínio ou automutilação Descritor: Relato ou suspeita 8-Paciente com transtorno mental em crise aguda Descritor: Desorientação no tempo, lugar de não reconhecimento de pessoas, incapacidade de cumprir ordens simples, pensamento desconexo. 9-Paralisia flácida aguda de MMII, simétrica ou assimétrica Descritor: Paralisia flácida simétrica de MMII, ou assimétrica acometendo qualquer membro.	
	1-Fraqueza muscular dos membros inferiores e/ou paresias de qualquer membro de início súbito Descritor: Fraqueza muscular de MMII de início súbito ou paresias em qualquer membro. 2-SpO² entre 91-94% 3-Vômitos moderados Descritor: Mais de 3 episódios de vômitos nas últimas 12 horas, porém sem vômitos incoercíveis. 4-Relato de perda de consciência nas últimas 24 horas Descritor: Perda de consciência nas últimas 24 horas. 5-Deficiência neurológica NOVA Descritor: Déficit motor (paresia ou paralisia) acima de 24 horas.	AMARELO
	1-SpO² ≥ 95% 2-Relato de perda de consciência acima de 24 horas Descritor: História de perda de consciência ou desmaio. 3-Vômitos esparsos Descritor: Até 3 episódios de vômitos nas últimas 12 horas.	VERDE

Dor torácica		
Dor torácica	1-Sinais de choque Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oliguria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10 anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS.	VERMELHO
	1-Desconforto respiratório Descritor: Tiragens intercostais; subcostais; retração de fúrcula; BAN. 2- Cianose aos pequenos esforços Descritor: Comer; falar; andar. 3-Dor intensa (7-10) Descritor: Ver escala de dor. 4-SpO² de 85- 90% 5-Associada a trauma súbito Descritor: Evento até 12 horas.	LARANJA
	1-Piora com a respiração 2-Dor moderada (4-6) Descritor: Ver escala de dor. 3-Associada a trauma agudo Descritor: Evento de 12 a 24 horas. 4-Sensação de aperto torácico e ansiedade Descritor: Associado a stress agudo; podendo estar associado a sudorese fria das extremidades ou taquipneia ou tontura.	AMARELO
	1-Dor leve (1-3) Descritor: Ver escala de dor. 2-Associada a tosse frequente Descritor: Tosse frequente que ocorre após processos virais sem afetar atividades e sem febre. 3-Piora ao movimento do tronco ou membros superiores	VERDE
	1-Dor superficial crônica à compressão 2-Dor referida ou que melhora com repouso Descritor: Dor relatada > 7 dias e/ou que melhora ao repouso.	AZUL

Dor de cabeça. *Verificar Pressão arterial		
Dor de cabeça. *Verificar Pressão arterial	1-Sinais de choque Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg.	VERMELHO
	1-Dor intensa (7-10) Descritor: Ver escala de dor. 2-Sinais Vitais Alterados Descritor: ver tabela FC e FR 3-Alteração do sensório ou de comportamento 4-Rigidez na nuca 5-Sinais focais 6-Vômitos em jato 7-Temperatura ≥ 39,5 °C	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6) Descritor: Ver escala de dor. 2-Alterações Visuais 3-Náuseas; Vômitos 4-Temperatura de 38,5 °C a 39,4°C	AMARELO
	1-Dor leve (1-3) Descritor: Ver escala de dor. 2-Temperatura entre 37,5°C e 38,4°C	VERDE
	1-Apenas referida, sem febre, e com sinais vitais normais	AZUL

Dor abdominal		
Dor abdominal	1-Sinais de choque Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg.	VERMELHO
	1-Dor intensa (7-10) Descritor: Ver escala de dor. 2-Vômitos incoercíveis Descritor: Vômitos incessantes mesmo após medidas para alívio ou não tem intervalo entre os episódios; 5 ou mais episódios de vômito na última hora. 3-Temperatura ≥ 39,5°C	LARANJA
	1-Distensão abdominal aguda 2-Fezes com sangramento vivo e/ou vômitos sanguinolentos 3-Dor moderada (4-6) Descritor: Ver escala de dor. 4-Vômitos persistentes 5-Retenção urinária 6-Temperatura de 38,5°C a 39,4°C	AMARELO
	1-Dor leve (1-3) Descritor: Ver escala de dor. 2-Náuseas ou vômitos ocasionais 3-Disúria 4-Temperatura entre 37,5°C e 38,4°C	VERDE
	1-Halitose Descritor: Presença de halitose sem sinais de acometimento sistêmico.	AZUL

Dor de ouvido		
Dor de ouvido	1-Dor intensa (7-10) Descritor: Ver escala de dor. 2-Choro agudo, contínuo e inconsolável 3-Sangramento auricular vivo, visível 4-Rigidez de nuca e/ou ataxia	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6) Descritor: Ver escala de dor. 2-Recusa ou dificuldade para se alimentar 3-Tumefação dolorosa retroauricular Descritor: Aumento de volume retroauricular com dor.	AMARELO
	1-Dor leve (1-3) Descritor: Ver escala de dor. 2-Otorréia	VERDE

Dor em extremidades	Dor em extremidades	
	1-Associada a comprometimento vascular distal Descritor: Má perfusão, pulsos impalpáveis; palidez; pele fria; cianose. 2-Dor intensa (7-10) Dor à deambulação ou ficar em pé. Ver escala de dor.	LARANJA
	1-Dor nas panturrilhas com prejuízo na marcha Descritor: Dor nas articulações associado a edema, rubor e calor local. 2-Dor moderada (4-6) Descritor: Ver escala de dor. 3-Artralgia com limitação e sinais flogísticos	AMARELO
	1-Distensões, contusões, torções 2-Dor leve (1-3) Descritor: Ver escala de dor. 3-Artralgia sem sinais flogísticos	VERDE
	1-Dor superficial crônica à compressão	AZUL

Vômitos e diarreia (Observação: atentar para diabetes)**1-Desidratação grave**

Descritor: Comatoso; hipotônico; olhos muito fundos e encovados; respiração acidótica; não é capaz de beber; pulsos finos ou ausentes; sinal da prega desaparece muito lentamente > 2 segundos; PA indetectável; oligúria; perda de peso maior que 10%; fontanela deprimida.

2-Sinais de choque

Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10 anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg.

VERMELHO**1-Desidratação moderada (3-6 sinais de desidratação)**

Descritor: Irritado; olho fundo; lágrima ausente; sedento; pulso rápido e fraco; sinal da prega que desaparece lentamente > 2 segundos; fontanela deprimida; taquicardia; mucosa seca; perda de peso de 5 - 10%.

2-Dispneia

Descritor: Desconforto respiratório.

3-Glicemia >200 mg/dl ou glicemia < 50 mg/dl no RN e < 60 mg/dl em crianças

Descritor: Presença de sangue nas fezes e/ou vômitos.

4-Fezes com sangramento vivo e/ou vômitos sanguinolentos**LARANJA****1-Desidratação leve (< 3 sinais de desidratação)**

Descritor: Mucosas secas e oligúria.

2-Fezes em geléia de groselha ou enegrecidas

Descritor: Fezes com aspecto gelatinoso e avermelhadas geralmente associada a dor abdominal.

AMARELO**1-Quadro agudo SEM desidratação**

Descritor: Presença de diarreia ou vômitos sem sinais de desidratação.

2-Diarreia sanguinolenta >15 dias sem desidratação

Descritor: Presença de fezes sanguinolentas de evolução crônica sem sinais de desidratação.

VERDE**12-Diarreia > 15 dias sem desidratação****AZUL**

Alterações cutâneas: feridas; palidez; afecções pele	Alterações cutâneas: feridas; palidez; afecções pele	
	1-Respiração irregular Descritor: A respiração regular é silenciosa e o trabalho respiratório é mínimo. A frequência respiratória normal é de 30 a 60 irpm no RN; de 25 a 40 aos 6 meses; de 20 a 30 com 1 ano; de 20 a 25 com 3 anos; de 12 a 25 aos 6 anos; e de 12 a 20 aos 10 anos. 2-Sinais de choque Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10 anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg. 3-Toxemiado, prostrado Descritor: Criança largada no colo dos pais; pálida; hipoativa ou não reativa; sonolenta ou desorientada.	VERMELHO
	1-Ferimento extenso com sangramento ativo 2-Palidez, sudorese e taquicardia inexplicada Descritor: Feições ou sinais de dor intolerável. 3-Dor intensa (7-10) Descritor: Edema em toda a face ou que envolva mais de um local tais como: pálpebra, lábio, língua ou lóbulo de orelha. 4-Edema facial Descritor: Máculas, manchas ou erupção que não desaparecem à digito pressão ou ao teste do vidro. 5-Equimoses, púrpura e/ou petéquias 6-Temperatura $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ até 3 meses de idade; Temperatura $\geq 39,5^{\circ}\text{C}$ > 3 meses de idade Descritor: Feições ou sinais de dor moderada.	LARANJA
	1-Dor moderada (4-6) Descritor: Febre > 38°C; associada a ferida com pus, ou com odor fétido; ou com sinais francos de reação inflamatória (lesão quente, ou muito vermelha, ou dolorosa). 2-Ferida infectada com temperatura de $37,5^{\circ}\text{C}$ a $38,4^{\circ}\text{C}$ até 3 meses; Temperatura de $38,5^{\circ}\text{C}$ a $39,4^{\circ}\text{C}$ > 3 meses de idade. 3-Ferida corto-contusa ou ferimento com sangramento que cede à compressão Descritor: Aumento de volume de pele e partes moles, com ou sem vermelhidão local.	AMARELO

	4-Tumefação dolorosa com ou sem hiperemia com temperatura de 37,5°C a 38,4°C até 3 meses; temperatura de 38,5°C a 39,9°C > 3 meses de idade Descritor: Elevações cutâneas avermelhadas; generalizadas; com ou sem prurido, desaparece à digito pressão. 5-Placas eritematosas de início súbito Descritor: Vesículas ou bolhas de grandes proporções que se rompem fácil dano à imagem de queimaduras, que podem também acometer as mucosas. 6-Lesões bolhosas extensas integras ou rotas, podendo acometer mucosas Descritor: Vesículas ou bolhas distintas ou confluentes que alcançam mais de 10% da superfície corporal por meio da regra dos nove de Wallace; a qual estima 9% de superfície corporal para cada uma das regiões a seguir: cabeça e pescoço, cada membro, cada quadrante do tronco, cada coxa; cada perna e pé, e prurido; envolvendo mais de uma região corporal. 7-Erupções secretantes ou bolhosas em mais de 10% corpo associado a prurido Descritor: Lesão localizada, sem febre, com pus, ou com odor fétido, ou com sinais de reação inflamatória (calor local, edema, hiperemia ou dor)	
	1-Lesão infectada sem febre ou tumefação local 2-Relato de episódios de sangramento nas últimas 24 horas Descritor: Feições ou sinais de dor leve. 3-Dor leve (1-3) Descritor: Escoriações; feridas fechadas e sem queixas; ausência de sinais ou sintomas de infecção e ou inflamação.	VERDE
	1-Lesão superficial sem sinais sistêmicos Descritor: Prurido isolado ou não persistente e sem repercussões sistêmicas 2-Prurido leve	AZUL

Queimaduras	Queimaduras	
	1-Sinais de choque Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10 anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg. 2-SCQ > 10% 3-Queimaduras associadas a politrauma 4-Queimaduras químicas Descritor: Inalação em ambientes confinados; inalação de fumaça e/ou produtos químicos; queimaduras de vias aéreas (rouquidão; dispneia; cianose; tosse metálica; escarro fuliginoso). 5-Queimaduras de face/inalação de fumaça Descritor: Alta voltagem. 6-Queimaduras elétricas Descritor: Acometimento significativo de genitália.	VERMELHO
	1-Queimaduras de genitália Descritor: Extremidades frias e/ou cianóticas; membro rígido/endurecido; dificuldade de mobilizar. 2-Queimadura circunferencial - risco de síndrome compartimental 3-Queimaduras agudas com menos de 1 hora de ocorrência, de SCQ < 10% Descritor: Maus tratos; violência	LARANJA
	1-Outras queimaduras associadas a comorbidades clínicas ou situação de risco social Descritor: Queimadura com sinais de infecção (eritema, flogose, com ou sem prurido). 2-Sinais de infecção Descritor: Lesão com prurido; hiperemia; limitação parcial de movimentos	AMARELO
	1-Queimaduras com mais de 24 horas associadas a queixa clínica nova Descritor: Somente relato de queimadura.	VERDE
	1-Queimaduras com mais de 24 horas sem alterações clínicas	AZUL

Intoxicação exógena	Intoxicação exógena	
	1-PCR, bradicardia ou PCR iminente Descritor: Ausência de reação; crise convulsiva; dificuldade ou ausência de respiração; ausência de sons cardíacos; ausência de movimento torácico; pele fria e azulada; ausência de pulso carotídeo, braquial ou femoral, bradicardia < 60 bpm; associada a má perfusão, taquipneia ou bradipneia; alteração do nível de consciência. 2-Apneia; bradipneia ou movimentos tóraco abdominais paradoxais Descritor: Interrupção da respiração por 20 segundos, ou por qualquer tempo; quando associada a alteração na cor, tônus musculares ou frequência cardíaca; com dificuldade respiratória; sialorreia intensa; estridor; voz abafada e cianose. 3-Convulsão em atividade Descritor: Crise convulsiva à admissão. 4-Cianose central Descritor: Língua, mucosas orais e pela azuladas ou roxas; ocorre devido problemas no coração ou no pulmão; o sangue já chega desoxigenado aos capilares por falta de oxigenação do sangue nos pulmões. 5-Paciente não responsivo, Glasgow < 8 Descritor: Ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso; agitação psicomotora ou sinais focais. 6-Sinais de choque Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg. 7-Edema labial e/ou de língua com sensação de garganta fechando Descritor: Início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas respiratórios prévios; edema de lábio ou língua; em uso de traqueostomia (obstrução, deslocamento da mesma). 8-Ingestão de soda cáustica 9-Lesão ocular química	VERMELHO
Intoxicação exógena	1-Alteração sensório ou de comportamento: Glasgow de 9-14; agitação psicomotora Descritor: Agitação; confusão mental; hipoatividade; desorientação; ataxia; fala desconexa; boca seca; sialorreia; sudorese. 2-Contato com produtos químicos de alta letalidade Descritor: Alta probabilidade da substância de causar o óbito ou a doença grave (raticidas,	LARANJA

	agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, plantas, medicamentos). 3-SpO₂ ≤ 90% Descritor: Exceto acetaminofeno (paracetamol), paraquat, cogumelo Amanita phalloides, hidrocarboneto, difenoxilato (nesses casos, os efeitos podem aparecer após horas ou dias). 4-Ingestão de substâncias há menos de 6 horas Descritor: História de exposição corporal a alguma substância irritante	
	1-Prurido e/ou irritabilidade em superfície corporal extensa 2-Cefaléia; náuseas; diarreia 3-SpO₂ entre 91 a 94%	AMARELO

Mordeduras e picadas de animais	Mordeduras e picadas de animais	
	1-PCR, bradicardia ou PCR iminente Descritor: Ausência de reação; crise convulsiva; dificuldade ou ausência de respiração; ausência de sons cardíacos; ausência de movimento torácico; pele fria e azulada; ausência de pulso carotídeo; braquial ou femoral; bradicardia. 2-Sinais de choque Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10 anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg. 3-Mutilação Descritor: Amputação ou perda de partes corporais por mordedura humana ou animal. 4-Lesão de grandes vasos ou hemorragia grave Descritor: Lesões com sangramento visível a despeito de medidas compressivas; em jatos ou esguichos de sangue. 5-Acidente com animal peçonhento com acometimento sistêmico Descritor: Acidente ofídico; escorpiônico ou aracnídeo em que a criança apresenta-se largada no colo dos pais; pálida; hipoativa ou não reativa; sonolenta ou desorientada.	VERMELHO
Mordeduras e picadas de animais	1-Estridor ou dispneia Descritor: Esforço respiratório; respiração ruidosa e estridor. 2-Edema facial Descritor: Edema em toda a face ou que envolva mais de um local tais como: pálpebra, lábio, língua ou lóbulo de orelha. 3-Acidente com animal peçonhento com sinais e sintomas locais Descritor: Acidente ofídico; escorpiônico ou aracnídeo sem toxemia. 4-Dor intensa (7-10) 5-Prurido intenso Descritor: Prurido intolerável. 6-Ferida profunda Descritor: Ferida sem perda de substância por mordedura humana ou animal. 7-Ferimento extenso por mordedura ou em áreas críticas Descritor: Ferimentos de segmento cefálico, mãos e pés. 8-Hemorragia não controlada em definitivo Descritor: Hemorragia que cessou, mas retorna de imediato ao cessar a compressão.	LARANJA

	1-História anterior de alergia com reação grave Descritor: História anterior de urticária; edema de glote ou asma que levou a internação com risco de morte. 2-Dor moderada (4-6) 3-Acidente rábico potencial Descritor: Mordedura; arranhadura ou lambadura em mucosa ou pele não íntegra por cães, gatos, morcegos ou outros animais silvestres, inclusive domiciliados. 4-Erupção ou vesículas disseminadas Descritor: Vesículas ou bolhas distintas ou confluentes que alcançam mais de 10% da superfície corporal por meio da regra dos nove de Wallace; a qual estima 9% de superfície corporal para cada uma das regiões a seguir: cabeça e pescoço, cada membro, cada quadrante do tronco, cada coxa, cada perna e pé (vide imagem); prurido, envolvendo mais de uma região corporal. 5-Hemorragia leve controlada Descritor: Mordedura com hemorragia associada a ferida pequena. 6-Prurido moderado	AMARELO
	1-Infecção ou inflamação local Descritor: Lesão localizada; sem febre; com pús, ou com odor fétido; ou com sinais de reação inflamatória (lesão quente, ou muito vermelha, ou dolorosa). 2-Prurido leve Descritor: Feições ou sinais de prurido leve. 3-Dor leve (1-3) 4-Mordedura não-extensa, exceto áreas críticas Descritor: Mordedura sem hemorragia associada. 5-Ferida pequena sem sangramento 6-Lesão superficial leve sem sinais sistêmicos Descritor: Escoriações; feridas fechadas e sem queixas; ausência de sinais ou sintomas de infecção e ou inflamação.	VERDE

Febre (Recomendação: prescrever antitérmico enquanto aguarda. Classificar uma hora após)	Febre	
	1-Inconsciente, alternância sonolência-irritabilidade Descritor: Não acorda ou não se mantém acordado. 2-Sinais de choque Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg. 3-Alteração grave na cor da pele; lábios e língua Descritor: Palidez importante visível; pele marmórea; paciente acinzentado ou cianótico.	VERMELHO
	1-Dispneia moderada ou intensa Descritor: Incursões respiratórias de esforço moderado ou grave; tiragem subcostal; BAN; tiragem supraclavicular e de fúrcula; balanço tóraco-abdominal. 2-Choro agudo, contínuo e inconsolável; gemência; apatia 3-SpO₂ < 90% 4-Desidratação moderada (3-6 sinais de desidratação) Descritor: Irritado; olho fundo; lágrima ausente; sedento; pulso rápido e fraco; sinal da prega que desaparece lentamente > 2 segundos; fontanela deprimida; taquicardia; mucosa seca; perda de peso de 5 - 10%. 5-Temperatura < 35° ou ≥ 39,5°C (1h após uso de antitérmico) Descritor: 1h após uso de antitérmico 6-Manchas da pele que não desaparecem à dígito-pressão 7-Fontanela abaulada 8-Calafrios	LARANJA
	1-SpO₂ entre 91 a 94% 2-Dispneia leve Descritor: Incursões respiratórias de esforço leve; tiragens intercostais. 3-Lactentes que não estejam aceitando alimentação Descritor: Menores de 24 meses de idade com recusa alimentar. 4-Desidratação leve (< 3 sinais de desidratação) Descritor: Mucosas secas e oligúria. 5-Temperatura de 38,5°C a 39,4°C Descritor: 1h após uso de antitérmico. 6-Febre por > 72 horas	AMARELO

	Descritor: Atentar ao risco de reação vacinal com necessidade de notificação. 7-Alterações musculares; articulares ou cutâneas Descritor: Rigidez corporal; edema de membro ou de articulação; incapacidade de movimentação de um membro ou extremidade.	
	1-Temperatura entre 37,5°C e 38,4°C Descritor: Febre sem sinais de gravidade. (1h após uso de antitérmico) 2-Relato de febre < 72 horas	VERDE

RN (0-3meses)	
RN (0-3meses)	1-Cianose central 2-Apatia, hiporresponsividade, hipotonia 3-PCR, bradicardia ou PCR iminente 4-Apneia; bradipneia ou movimentos tóraco abdominais paradoxais 5-Tiragem subcostal grave; BAN ou apnéia VERMELHO
	1-Não consegue mamar ou beber nada acima de 6 horas Descritor: Fazer glicemia. <50 ver tabela. 2-Frequência respiratória > 60 ou < 30 irpm 3-Palidez generalizada intensa ou pele mosqueada ou rendilhada Descritor: Equimoses, petéquias e ou hemorragias. 4-SpO² < 93% 5- Três episódios de vômitos na última hora 6-Manifestações de sangramento Descritor: Em grande quantidade ou muito extensas. 7-Icterícia abaixo do joelho ou antes de 24 horas de vida 8-Temperatura < 35°C ou ≥ 38,5°C LARANJA
	1-Secreção purulenta no ouvido ou nos olhos Descritor: Abundante e com edema palpebral. 2-Palidez palmar intensa 3-Secreção purulenta no umbigo Descritor: Com eritema que se estende para pele ao redor. 4-Pústulas ou vesículas na pele 5-Temperatura de 37,5°C a 38,4°C 6-Tosse persistente Descritor: Poucas e localizadas 7-Icterícia abaixo do umbigo AMARELO
	1-Secreção purulenta nos olhos Descritor: Sem edema palpebral. 2-Secreção purulenta no umbigo e/ ou eritema sem estender-se para pele ao redor 3-Pústulas na pele VERDE

	4-Placa branca na boca	
--	-------------------------------	--

Violência física; sexual; tentativa suicídio; envenenamento, intoxicações intencionais, e acidente perfuro cortante e/ou exposição a material biológico

Violência física; sexual; tentativa suicídio; envenenamento, intoxicações intencionais, e acidente perfuro cortante e/ou exposição a material biológico

1-PCR, bradicardia ou PCR iminente

2-Alterações respiratórias: apneia, bradipneia, ou movimentos tóraco abdominais paradoxais

3-Convulsão em atividade

Descritor: Crise convulsiva à admissão.

4-Sinais de choque

Descritor: *Taquicardia (vide anexo); palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria; Hipotensão - 70mmHg + (idade x 2) de 1 a 10anos; Neonatos (0-28 dias): PAS < 60 mmHg; Lactentes (1-12 meses): PAS < 70 mmHg; Crianças acima de 10 anos: PAS < 90 mmHg.

5-Cianose central

6-Paciente não responsivo; Glasgow < 8

Descritor: Obstrução de vias aéreas; trauma de face; hemorragia grave; sinais de choque; Glasgow < 8.

7-Hemorragia sem controle

Descritor: Lesões com sangramento visível a despeito de medidas compressivas; em jatos ou esguichos de sangue.

8-Edema labial e/ou de língua com sensação de garganta fechando

Descritor: Relato e/ou edema ou lesão em área genital/lesão de palato ou dentes anteriores/sangramento genital em pré-puberes/sangramento; fissuras ou cicatrizes anais/rompimento himenal.

VERMELHO

1-Dispneia moderada ou intensa

Descritor: Incursões respiratórias de esforço moderado ou grave; tiragem subcostal; BAN; tiragem supraclavicular e de fúrcula; balanço tóraco-abdominal.

2-SpO₂ ≤ 90%

3-Alteração sensório ou de comportamento: Glasgow de 9-14; agitação psicomotora

4-Acidente com material perfuro cortante ou exposição a material biológico

Descritor: Ingestão de grande volume de produto cáustico ou tóxico, que, em caso de ingestão acidental não seriam tomados em grandes volumes devido ao gosto ser ruim ou pela dor que provoca.

5-Violência sexual menos de 72 horas – evento agudo; crônico agudizado -

LARANJA

	desconfiar de violência 6-Ingestão ou exposição de substâncias há menos de 6 horas	
	1-Dispneia leve Descritor: Incursões respiratórias de esforço leve; tiragens intercostais. 2-Hemorragia leve controlada Descritor: Hemorragia associada a ferida pequena 3-História de tentativas recorrentes de suicídio 4-Violência sexual mais de 72 horas; evento crônico Descritor: (Sorologias (IST, HIV), status vacinal, investigação de gestação) 5-Violência psicológica e/ou moral Descritor: Sinais de sofrimento psíquico: apatia; depressão; ansiedade; agressividade; baixa autoestima; distúrbios do sono; enurese noturna. 6-Ideação suicida Descritor: Ideação suicida. 7-Autoflagelação Descritor: Lesões superficiais geralmente em face extensora de antebraço e coxa; pode culminar em tentativa de suicídio.	AMARELO

Anemia Falciforme	
Anemia Falciforme	1-Sinais de choque 2-Convulsão em atividade 3-Paciente não responsivo; Glasgow < 8 Descritor: Ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso; agitação psicomotora ou sinais focais VERMELHO
	1-Dor intensa (7-10) Descritor: Dor abdominal; torácica; em membros; lombar; sem resposta ao uso de analgésico. 2-Ereção persistente e dolorosa 3-Temperatura $\geq 38^{\circ}\text{C}$ Descritor: Tax $> 38^{\circ}\text{C}$. 4-Aumento de volume articular 5-Dispneia 6-Hemiparesia Descritor: Dificuldade de mobilizar o membro; podendo ter sinais flogísticos (edema, calor, eritema e dor). 7-Deficiência neurológica iniciada nas últimas 24 horas Descritor: Déficit motor (paresia ou paralisia) nas últimas 24 horas. 8-Vômitos frequentes 9-Aumento súbito da palidez associado a fraqueza e hipoatividade; e/ou aumento súbito do abdome 10-Icterícia com dor abdominal LARANJA
	1-Icterícia Descritor: Icterícia sem febre ou dor. 2-Náuseas e vômitos 3-Dor leve a moderada (≤ 6) Descritor: Dor em extremidades, associada a edema, melhora com analgésicos. 4-Deficiência neurológica iniciada há mais de 24 horas. Descritor: Déficit motor (paresia ou paralisia) acima de 24 horas. 5-Temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$ e $< 38^{\circ}\text{C}$ 6-Hematúria Descritor: Urina de coloração escura sem associação com outros sinais ou sintomas. AMARELO

Hemofilia		
Hemofilia	1-Hematoma de iliopsoas com compressão neurológica ou hematoma volumoso ou retroperitônio 2-Hemorragia em região cervical 3-Hemorragia volumosa associada a síndrome compartimental 4-Trauma craniano/SNC	VERMELHO
	1-Hematoma de iliopsoas sem compressão 2-Hemorragia gastrointestinal 3-Hemorragia muscular extensa 4-Hemoartrose	LARANJA
	1-Ferimento corto-contuso 2-Hematúria 3-Sangramento cutâneo ou mucoso (epistaxe, equimose, gengivorragia)	AMARELO

Comportamento Suicida		
Comportamento Suicida (tentativa de suicídio, plano suicida, intenção suicida). Realizar notificação compulsória da simples suspeita. Ponderar a necessidade de acionar o CIATOX (suporte e retaguarda às intoxicações e abuso de substância).	1-Trauma grave (enforcamento, arma branca, PAF, afogamento) Descritor: Tentativa grave de suicídio, com risco de morte. 2-Intoxicação grave 3-Choque 4-Sangramento ativo	VERMELHO
	1-Juízo crítico alterado, delírios e alucinações 2-Alucinações auditivas de comando com conteúdo suicida Descritor: Especialmente em transtornos psicóticos e transtornos de humor 3-Tentativa planejada ou não planejada com métodos de alta letalidade Descritor: Tentativa planejada, longe de alguém para socorrer com intenção de morrer. Métodos de alta letalidade: enforcamento, arma de fogo, arma branca, intoxicação exógena. 4-Plano de suicídio definido de caráter imediato e acesso aos meios de execução Descritor: Plano estruturado de se matar, com acesso aos meios de execução. 5-Intenção iminente de morrer ou se matar 6-Intenção suicida futura ou determinação em repetir a tentativa 7-Comportamento impulsivo 8-Abuso de substâncias Descritor: Álcool, drogas ilícitas e/ou medicamentos 9-História prévia de grave tentativa de suicídio	LARANJA
	1-Tentativa planejada ou não planejada com outros métodos 2-Pensamentos e planos suicidas sem caráter imediato 3-Intenção de morrer ou de se matar 4-Comportamento negligente Descritor: Recusa a medicar-se ou tratar-se ou higienizar-se ou hidratar-se ou alimentar-se 5-Automutilação, sem intenção de se matar 6-História prévia de tentativa de suicídio	AMARELO
	1-Pensamentos suicidas ocasionais, sem planejamento	VERDE

Comportamento agitado ou agressivo		
Comportamento agitado ou agressivo	1-Agressividade consumada contra os outros e/ou destruição de patrimônio 2-Agressividade com juízo crítico alterado, delírios e alucinações 3-Sob contenção física ou química devido episódio de grave agressividade e/ou agitação	VERMELHO
	1-Agitação psicomotora Descritor: Inquieto, irritado, explora todo o ambiente, fala acelerada, invade o espaço do outro 2-Desorientação quanto a si, no tempo e no espaço Descritor: Não sabe quem é, a data de hoje, onde se encontra 3-Abuso de substâncias Descritor: Álcool, drogas ilícitas e/ou medicamentos 4-Ausência ou redução de motricidade, recusa a se alimentar, hidratar ou mudar de posição Descritor: Catatonia	LARANJA

Recusa em se alimentar e/ou transtornos alimentares. Conferir peso e altura	Recusa em se alimentar e/ou transtornos alimentares. Conferir peso e altura	
	1-Sinais visíveis de desnutrição 2-Recusa alimentar e/ou vômitos autoprovocados de repetição 3-Juízo crítico alterado, delírios e alucinações 4-Ausência ou redução de motricidade, recusa a se alimentar, hidratar ou mudar de posição Descritor: Catatonia	LARANJA
	1-Compulsão alimentar associada a comportamentos exagerados para emagrecer Descritor: Vômitos autoprovocados, uso de laxativos, exercícios exagerados	AMARELO

Queixas urinárias / Dor testicular		
Queixas urinárias /Dor testicular	1-Prostração, palidez cutânea ou sudorese 2-Dor escrotal aguda 3-Priapismo Descritor: ereção peniana dolorosa 4-Dor intensa (7-10) 5-Hematúria 6-Descritor: presença anormal de eritrócitos na urina 7-Gangrena no escroto 8-Celulite de escroto 8-Retenção urinária aguda com bexigoma LARANJA	
	1-Disúria intensa com polaciúria e/ou hematúria Dor moderada 2-Dor leve a moderada (≤ 6) 3-Vômito persistente AMARELO	
	1-Trauma superficial de escroto 2-Corrimento uretral amarelado fétido 3-Troca de sonda vesical obstruída 4-Dor leve (1-3) 5-Evento Recente Descritor: Evento recente < 7 dias VERDE	

Queixas oculares		
Queixas oculares	1-Trauma ocular 2-Dor intensa (7-10) 3-Perda visual súbita ou diplopia	LARANJA
	1-Dor leve a moderada (≤ 6) 2-Celulite periorbitária	AMARELO
	1-Dor leve (1-3) 2-Sensação de corpo estranho 3-Hemorragia na esclera Descritor: Sem história de trauma. 4-Olho avermelhado e/ou secreção Descritor: Sem história de trauma, contato com substância química ou solda.	VERDE

REFERÊNCIAS

1. - *Cadernos Humaniza SUS*; v. 1. 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 32p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
2. AMERICAN HEART ASSOCIATION. Edição em português: *suporte avançado de vida em pediatria - Manual do profissional*. Mauá: American Heart Association; 2012.
3. ARORA R, MAHAJAN P. Evaluation of child with fever without source: review of literature and update. *Pediatr Clin North Am*. 2013;60(5):1049-62.
4. ARULKUMARAN N, SINGER M. PUERPERAL sepsis. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2013 Dec;27(6):893-902. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2013.07.004. Epub 2013 Aug 30.
5. BEACH RL, KAPLAN PW. Seizures in pregnancy: diagnosis and management. *Int Rev Neurobiol*. 2008;83:259-71. doi: 10.1016/S0074-7742(08)00015-9.
6. BOTTOMLEY C, BOURNE T. Management strategies for hyperemesis. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2009 Aug;23(4):549-64. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2008.12.012. Epub 2009 Mar 3.
7. BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do ministro. Portaria n.º 1600, de 7 de julho de 2011: *Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde*. Brasília 2011.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização*. Humaniza SUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4 ed. 4 reimp. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010.72p. : Il. Color. (Serie B. Textos Básicos de Saúde);
9. BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do ministro. Portaria n.º 1010, de 21 de maio de 2012: *Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências*. Brasília 2012.
10. BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do ministro. Portaria n.º 2048, de 5 de novembro de 2002: *Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência*. Brasília 2002.
11. BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do ministro. Portaria n.º 2395, de 11 de outubro de 2011: *Organiza o Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde*. Brasília 2011.
12. BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do ministro. Portaria n.º 342, de 4 de março de 2013: *Redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, e dispõe sobre incentivo financeiro de investimento para novas UPA 24h (UPA Nova) e UPA 24h ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal*. Brasília 2013.
13. BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do ministro. Portaria n.º 3390, de 30 de dezembro de 2013: *Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelecendo as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde*. Brasília 2013.
14. BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do ministro. Portaria n.º 3410, de 30 de dezembro de 2013: *Institui a Política Nacional de Contratualização dos Hospitais no âmbito do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar*. Brasília 2013.
15. BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do ministro. Portaria n.º 4279, de 30 de dezembro de 2010: *Estabelece as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde*. Brasília 2010.
16. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1459, de 24 junho de 2011. *Institui, no âmbito*

- do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha*. Diário Oficial da União n.27, seção 1, p.109, 27 de junho de 2011
17. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2351, de 05 outubro de 2011. *Altera a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede Cegonha*. Diário Oficial da União n.193, seção 1, p.58, 06 de outubro de 2011.
 18. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS na atenção básica. 1. Ed. Brasília, 2009. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. *Acolhimento nas práticas de produção de saúde*. 2 ed; 6.reimp.Brásilia: Editora do Ministério da Saúde, 2012.
 19. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013: *Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS*.
 20. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013: *Institui a Política Nacional de Contratualização dos Hospitais no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar*. Acesso em Diário Oficial da União 26 de mai. de 2014.
 21. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Acolhimento à demanda espontânea / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica*. Brasília, 2011.56 p.: il. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume I).
 22. Brasil. Ministério da Saúde. *Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS*. 4 ed. 4 reimp. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010.72p. : Il. Color. (Serie B. Textos Básicos de Saúde);
 23. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. *Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização*. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 20 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
 24. BRASIL. Resolução Conselho Federal de Enfermagem Nº 423 de 9 de abril de 2012. *Normatiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do Enfermeiro na atividade de classificação de riscos*. Publicada no DOU nº 70, de 11 de abril de 2012, pág. 195 – Seção I.
 25. Ministério da Saúde (BR). Secretaria Executiva. *Núcleo Técnico da Política nacional de Humanização. HumanizaSUS. Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco: um paradigma ético-estético no fazer em saúde*. Brasília; 2004.
 26. Brasil. Resolução Conselho Federal de Enfermagem Nº 358 de 15 de outubro de 2009. *Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências*. Publicada no DOU nº 23 de outubro de 2009, pág.179 – Seção I.
 27. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.048, de 5 de novembro de 2002: *Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência*. Brasília, 2002. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html.
 28. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010: *Estabelece as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde*. Brasília, 2010.
 29. BRASIL. Resolução Conselho Federal de Medicina nº 2.079 de 14 de agosto de 2014. *Dispõe sobre a normatização do funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h e congêneres, bem como do*

dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho nessas unidades. Publicada no DOU de 16 de setembro de 2014, pág.81 – Seção I.

30. BRASIL. Resolução Conselho Federal de Medicina nº2.077 de 16 de setembro de 2014. *Dispõe sobre a normatização do funcionamento dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho.* Publicada no DOU de 16 de setembro de 2014, pág. 80 - Seção I.
31. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. *Acolhimento nas práticas de produção de saúde.* 2 ed; 6.reimp.Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.
32. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Acolhimento à demanda espontânea / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.* Brasília, 2011.56 p.: il. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume I).
33. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Formação e Intervenção/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde.* -Brasília: editora Ministério da Saúde, 2011. Série B. Textos básicos de saúde - Cadernos HumanizaSUS; v. 1.
34. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. *Atenção Hospitalar/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde.* Brasília: editora Ministério da Saúde, 2011. Série B. Textos básicos de saúde - Cadernos HumanizaSUS; v. 3.
35. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013: *Institui a Política Nacional de Contratualização dos Hospitais no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar.* Acesso em Diário Oficial da União 26 de mai. de 2014.
36. BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.395, de 11 de outubro de 2011: *Organiza o Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde.*
37. BRASIL. Portaria GM/MS nº 342, de 04 de março de 2013. *Redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, e dispõe sobre incentivo financeiro de investimento para novas UPA 24h (UPA Nova) e UPA 24h ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal.* Alterado pela portaria nº 104/GM/MS de 15.01.2014.
38. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. *Formação e Intervenção/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde.* -Brasília: editora Ministério da Saúde, 2011. Série B. Textos básicos de saúde
39. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. *Atenção Hospitalar/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde.* Brasília: editora Ministério da Saúde, 2011. Série B. Textos básicos de saúde - Cadernos Humaniza SUS; v. 3.
40. BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de ações programáticas e estratégicas. *Cadernos Humaniza SUS - Volume 1 - Formação e intervenção - Série B. Textos Básicos de Saúde.* Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
41. BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de ações programáticas e estratégicas. *Manual AIDPI Neonatal: quadro de procedimentos.* 5 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
42. BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção básica. *Cadernos de Atenção Básica. N.28 Acolhimento à demanda espontânea. Queixas mais comuns na atenção básica. Volume II.*

Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

43. BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção básica. Cadernos de Atenção Básica. N.33 *Saúde da Criança: crescimento e desenvolvimento*. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
44. BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção hospitalar às urgências. *Protocolos de suporte avançado de vida. Protocolos de intervenção para o SAMU 192 - Serviço de atendimento móvel de urgência*. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
45. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Núcleo da Política Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde*. 2.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006, 44 p.- (Série B. Textos Básicos de Saúde).
46. BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. *Núcleo técnico da política nacional de humanização. Humaniza SUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS*. Serie B. Textos Básicos de Saúde. 4 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
47. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sul. Acolhimento e classificação de risco nos Serviços de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2009, 56 p.- (Série B. Textos Básicos de Saúde).
48. BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Política nacional de humanização da atenção e gestão do SUS. O Humaniza SUS na atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
49. BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de atenção à saúde. Política nacional de humanização da atenção e gestão do SUS. Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
50. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde/SAS. Portaria nº 650, de 05 outubro de 2011. Dispõe sobre os Planos de Ação regional e municipal da Rede Cegonha, documentos orientadores para a execução das fases de implementação da rede, assim como o repasse dos recursos, monitoramento e a avaliação da implementação da Rede Cegonha. Diário Oficial da União n.193, seção 1, p.69, 06 de outubro de 2011
51. BRASIL. Portaria GM/MS nº 1.600, de 7 de julho de 2011: Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde. Disponível em: [bvsms.saude.gov.br/bvs/ saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html).
52. BRASIL. Portaria GM/MS nº 1010, de 21 de maio de 2012. Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1010_21_05_2012.html. BRASIL.
53. BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.395, de 11 de outubro de 2011: Organiza o Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde. Disponível em: bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2395_11_10_2011.html. Acesso em: 22 de mai. de 2014.
54. BRASIL. Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010: Estabelece as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Disponível em: [conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/ img/07_jan_portaria4279_301210.pdf](http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/img/07_jan_portaria4279_301210.pdf).
55. BRENNAN MC, MOORE LE. Pulmonary embolism and amniotic fluid embolism in pregnancy. *Obstet Gynecol Clin North Am*. 2013 Mar;40(1):27-35. doi:10.1016/j.ogc.2012.11.005.
56. BRITO V, NIEDERMAN MS. Pneumonia complicating pregnancy. *Clin Chest Med*. 2011 Mar;32(1):121-32, ix. doi: 10.1016/j.ccm.2010.10.004. Epub 2010 Dec 17.

57. BUSTINDUY, A. L. et al. Predictors of fever-related admissions to a paediatric assessment unit, ward and reattendances in a South London emergency department: the CABIN 2 study. *Arch Dis Child*, n. 102, p. 22–8, 2017.
58. CAPPELL MS, FRIEDEL D. Abdominal pain during pregnancy. *Gastroenterol Clin North Am*. 2003 Mar;32(1):1-58.
59. CARVALHO, W. B.; TROSTER, E. J.; BOUSSO, A. *Algoritmos em terapia intensiva pediátrica, neonatologia e emergências pediátricas*. São Paulo: Editora Atheneu, 2010.
60. CHUSID, M. J. Fever of Unknown Origin in Childhood. *Pediatr Clin North Am*, v. 64, n. 1, p. 205-230, 2017.
61. CIENA AP, GATTO R, PACINI VC et al. Influência da intensidade da dor sobre as respostas nas escalas unidimensionais de mensuração da dor em uma população de idosos e de adultos jovens. *Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina*, v. 29, n. 2, p. 201- 212, jul./dez. 2008 acessível em scielo.br/pdf/rbr/v51n4/v51n4a02.pdf
62. DA SILVA, S. F. Organização de redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil). *Ciênc Saúde Coletiva*, v. 16, n. 6, 2011.
63. DE, S. et al. Accuracy of the "traffic light" clinical decision rule for serious bacterial infections in young children with fever: a retrospective cohort study. *BMJ*, v. 346, p. f866, 2013.
64. DIGRE KB. Headaches during pregnancy. *Clin Obstet Gynecol*. 2013 Jun;56(2):317-29. doi: 10.1097/GRF.0b013e31828f25e6.
65. FERNANDES, F.R.;SETUBAL, J.L.;MARUJO,W.C. *Manual de urgências e emergências em pediatria do Hospital Infantil Sabará*. São Paulo: SARVIER, 2010.
66. FRANCO, T. B.; BUENO, W. S.; MERHY, E. E. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: o caso de Betim, Minas Gerais, Brasil. *Cad Saúde Pública*, v. 15, n. 2, p. 345-53, 1999.
67. FRANCO, TB; BUENO, WS; MERHY, EE. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: o caso de Betim, Minas Gerais, Brasil. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 15(2):345- 353, abr- jun, 1999.
68. GODOY, F. S. F. *Organização do trabalho em uma unidade de urgência: percepção dos enfermeiros a partir da implantação do acolhimento com avaliação e classificação de risco*. 2010. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal de Londrina, Londrina.
69. GRUPO DE TRIAGEM DE MANCHESTER. *Triagem do serviço de urgência*. 2ª ed. Portugal: BMJ Publishing; 2002.
70. HART LA, SIBAI BM. Seizures in pregnancy: epilepsy, eclampsia, and stroke. *Semin Perinatol*. 2013 Aug;37(4):207-24. doi: 10.1053/j.semperi.2013.04.001.
71. LA TORRE, F. P. F. et al. *Emergências em pediatria: protocolos da Santa Casa*. 2 ed. São Paulo: Editora Manole, 2013.
72. LAPINSKY SE. Obstetric infections. *Crit Care Clin*. 2013 Jul;29(3):509-20. doi:10.1016/j.ccc.2013.03.006. Epub 2013 Apr 30.
73. MAFRA, AA; MARTINS P, BELEZIA B, SHIMAZAKI ME, BARBOSA YR, RATES SMM, et al. *Acolhimento com classificação de risco no pronto-socorro do Hospital Municipal Odilon Behrens de Belo Horizonte*. Belo Horizonte, 2006.
74. MURAHOVSKI, J. *Pediatria: diagnóstico e tratamento*. 6 ed. São Paulo: Editora Sarvier, 2006.
75. Murphy VE, Gibson PG. Asthma in pregnancy. *Clin Chest Med*. 2011Mar;32(1):93-110, ix. doi: 10.1016/j.ccm.2010.10.001. Epub 2010 Dec 17.

76. PEARCE CF, HANSEN WF. Headache and neurological disease in pregnancy. *Clin Obstet Gynecol*. 2012 Sep;55(3):810-28. doi: 10.1097/GRF.0b013e31825d7b68.
77. REZENDE - *Obstetrícia Fundamental* - 12ª Ed. 2013; Montenegro, Carlos A. Barbosa; Montenegro, Carlos A. Barbosa; Rezende, Jorge de; Rezende, Jorge de; Guanabara Koogan.
78. SANTOS FILHO, S. B. *Avaliação e humanização em saúde*. 2 ed. Ijuí: Editora Ijuí, 2010.
79. SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA. *Cartilha do protocolo de acolhimento com classificação de risco*. Proposta de Metodologia para implantação nas Redes Regionais de Atenção do Estado da Bahia. Salvador, 2013.
80. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA. *Manual de Orientação para o acolhimento com avaliação e classificação de risco*. Goiânia: FMS, 2015.
81. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. *Protocolo de classificação de risco dos usuários na rede de urgências e emergências*. São José do Rio Preto: Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, 2013.
82. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS. *Protocolo de acolhimento com classificação de risco dos hospitais municipais de São Luís, Maranhão*. São Luís: Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, 2009.
83. SILVA, M. F. N. Protocolo de avaliação e classificação de risco de pacientes em unidade de emergência. *Rev Latino-Am Enfermagem*, v. 22, n. 2, p. 218-25, 2014.
84. SILVA, S.F. Organização de redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil). *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro , v. 16, n. 6, June 2011 .
85. SOGC - The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada. Fetal Health Surveillance: Antepartum and Intrapartum Consensus Guideline. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, v. 29, n. 9, supplement 4, sep. 2007.
86. SONKUSARE S. The clinical management of hyperemesis gravidarum. *Arch Gynecol Obstet*. 2011 Jun;283(6):1183-92. doi: 10.1007/s00404-011-1877-y. Epub 2011 Mar20.
87. STONE K. Acute abdominal emergencies associated with pregnancy. *Clin Obstet Gynecol*. 2002 Jun;45(2):553-61.
88. PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A (Org.). *Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde*. Rio de Janeiro: IMS-UERJ; Abrasco, p. 89-111, 2003.
89. VAZQUEZ JC, ABALOS E. Treatments for symptomatic urinary tract infections during pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011 Jan 19;(1):CD002256. doi: 10.1002/14651858.CD002256.pub2.
90. VERAS, J. E. G. L. F. et al. Classificação de risco em pediatria: construção e validação de um guia para enfermeiros. *Rev Bras Enferm*, v. 68, n. 5, p. 913-22, 2015.
91. WING, R.; DOR, M. R.; MCQUILKIN, P. A. Fever in the pediatric patient. *Emerg Med Clin North Am*, v. 31, n. 4, p. 1073-96, 2013.
92. FRANCO, TB; BUENO, WS; MERHY, EE. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: o caso de Betim, Minas Gerais, Brasil. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 15(2):345- 353, abr-jun, 1999.
93. SILVA, S F. Organização de redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de Saúde (Brasil). *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro , v. 16, n. 6, June 2011.
94. SILVA, M F N, et al. Protocolo de avaliação e classificação de risco de pacientes em unidade de emergência. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, Ribeirão Preto, v. 22,n. 2, 2014 . Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692014000200218&lng=en&nrm=iso>

ANEXOS

AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE DA DOR

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausência de dor, atividades normais, leve desconforto	Dor leve, não atrapalha as atividades normais. Pouca limitação			Dor moderada, causa dificuldades. Não realiza algumas atividades			Dor forte ou incapacitante, não realiza atividades habituais, causa descontrole			

ESCALA VISUAL DA DOR

AZUL	VERDE			AMARELO			LARANJA			
										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sem dor	Dor Leve			Dor moderada			Dor Intensa			

Fonte: sgas.saude.ms.gov.br

DICAS DE COMO ABORDAR O PACIENTE:

- Você tem dor?
- Como você classifica sua dor? (Deixe o paciente falar livremente, faça observações na ficha de CR sobre o que ele falar)

Observação:

- a) Se não tiver dor, a classificação é zero.
- b) Se a dor for leve, seu nível de referência é de 1 a 3.
- c) Se a dor for moderada, seu nível de referência é de 4 a 6.
- d) Se for intensa, seu nível de referência é de 7 a 10 (dor máxima igual a 10, é considerada laranja na CR, pois não representa risco de morte imediato).

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

ESCALA DE COMA DE GLASGOW		
RESPOSTA	FORMA	ESCORE
Abertura ocular	Espontânea	4
	Estimulação	3
	Estímulo doloroso	2
	Sem abertura	1
Resposta Verbal	Orientado	5
	Confuso	4
	Inapropriado	3
	Incompreensível	2
	Não responde	1
Resposta motora	Obedece ao comando	6
	Localiza a dor	5
	Movim. Inespecíficos (reflexo de retirada)	4
	Flexão à dor	3
	Extensão à dor	2
	Nenhuma	1
TOTAL		15

ESCALA DE COMA DE GLASGOW PEDIÁTRICA

ESCALA DE COMA DE GLASGOW MODIFICADA PARA CRIANÇAS		
RESPOSTA	FORMA	ESCORE
Abertura ocular	Espontânea	4
	Ordem verbal	3
	Estímulo doloroso	2
	Não abre	1
Melhor resposta	Balucio	5
	Choro irritado	4
	Choro à dor	3
	Gemido à dor	2
	Não responde	1
Melhor resposta motora	Movimento espontâneo e normal	6
	Reage ao toque	5
	Reage à dor	4
	Flexão anormal - decorticação	3
	Extensão anormal - descerebração	2
	Nenhuma	1
TOTAL		15

Fonte: jped.com.br/conteúdo/03-79-04-287/tabela_01.htm

DADOS VITAIS PEDIÁTRICO

Frequência Respiratória Pediátrica OMS	
IDADE	MOVIMENTOS/MINUTO
De 0 a 2 meses	Até 60 mrm
De 3 a 11 meses	Até 50 mrm
De 12 meses a 5 anos	Até 40 mrm
De 6 anos a 8 anos	Até 30 mrm
Acima de 8 anos	Até 25 mrm

Frequência Cardíaca Pediátrica OMS		
IDADE	BRADICARDÍA	TAQUICARDÍA
Neonatos até 30 dias	Até um mês FC < 100 BPM	FC > 180 bpm
Lactentes 1 mês -1 ano	De 1 a 12 meses FC < 90 BPM	FC > 160 BPM
Crianças de 13 meses a 2 anos	FC < 80 BPM	FC > 130 BPM
Idade Escolar 3 a 7 anos	FC < 70 BPM	FC > 120 BPM
Adolescentes 8-14 anos	FC < 60 BPM	FC > 110 BPM

HIPOTENSÃO EM PEDIATRIA	
IDADE	Pressão Arterial Sistólica
Neonatos (0-28 dias)	PAS < 60mmHg
Lactentes	PAS < 70mmHg
Crianças de 1 a 10 anos	PAS < 70 + (2x idade em anos) mmHg
Crianças acima de 10 anos	PAS < 90 mmHg

REGRA DOS NOVE DE WALLACE PARA ADULTO E CRIANÇAS ACIMA DE 10 ANOS - AVALIAÇÃO DA SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA

Cabeça	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Crânio} - 4,5\% \\ \text{Face} - 4,5\% \end{array} \right.$ corpórea	Total = 9% da superfície
Tórax	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Porção anterior} - 9\% \\ \text{Porção posterior} - 9\% \end{array} \right.$ corpórea	Total = 18% da superfície
Abdome	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Porção anterior} - 9\% \\ \text{Porção posterior} - 9\% \end{array} \right.$ corpórea	Total = 18% da superfície
Membros Superiores corpórea	$\left\{ \begin{array}{l} \text{D} - 9\% \\ \text{E} - 9\% \end{array} \right.$	Total = 18% da extensão
Membros Inferiores corpórea	$\left\{ \begin{array}{l} \text{D} - 18\% \\ \text{E} - 18\% \end{array} \right.$	Total = 36% da extensão
Pescoço	1%	

**REGRA DOS NOVE DE WALLACE PARA
ATÉ 10 ANOS - AVALIAÇÃO DA
SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA**

Até Um ano

Segmento corporal	Percentual da superfície queimada
Cabeça e pescoço	19%
Cada membro inferior	13%
Demais membros	= adulto

De Um – 10 anos

Segmento corporal	Percentual da superfície queimada
Cabeça e pescoço	19-idade
Cada membro inferior	13+ (idade÷)2
Demais membros	= adulto

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_queimaduras.pdf

Nota Técnica N.º 10/2021 - SES/SAIS/CAT – FLUXOS PARA COVID19

Os protocolos de Classificação de Risco Adulto, Obstétrico e Pediátrico vigentes compreendem os parâmetros definidos para a queixa respiratória; entretanto, a apresentação clínica e os parâmetros a serem considerados no paciente com suspeita de COVID-19 podem diferir de outras doenças respiratórias, sobretudo pela grande variedade de sintomas, hipoxemia dissociada de sintomatologia clínica e acometimento multissistêmico em pacientes graves e críticos.

Nesse sentido, baseado nas Diretrizes sobre o Diagnóstico e o Manejo Clínico- Farmacológico da COVID-19 em Adultos (versão 3.1) e as atualizações recentes, foram elaborados fluxos de classificação de risco para a suspeita de COVID-19 para adultos, gestantes e crianças, conforme Nota Técnica nº 10- Classificação de Risco para casos suspeitos de COVID-19, elaborada pela Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da COVID-19 - SES/SAIS/CAT-COVID19 e a Diretoria de Enfermagem, a fim de individualizar o cuidado aos pacientes com suspeita clínica de COVID-19 e permitir um melhor direcionamento para assistência adequada.

A utilização dos fluxogramas para casos suspeitos de COVID-19 está recomendada para adultos, gestantes e crianças com sintomas respiratórios (com presença de tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, rinorreia e espirros).

FLUXO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

ADULTOS COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS AGUDOS		
ADULTOS COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS AGUDOS (Avaliar-tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, rinorreia, espirros)	1-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica $\leq 80\text{mmHg}$), Taquicardia (FC $\geq 120\text{bpm}$) ou Bradicardia (FC $\leq 40\text{bpm}$), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída ou alteração do nível de consciência. 2- Saturação O2$< 88\%$ em ar ambiente (a.a.) 3-Respiração Inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 28 irpm; Cianose	VERMELHO
	1- Saturação O² $\geq 89\%$ e $\leq 93\%$ a.a. 2- Sinais de esforço respiratório. Descritor: 22 irpm $<$ FR ≤ 27irpm, com dificuldade de falar (fala monossilábica/ entrecortada). 3- Dor torácica intensa (7-10/10)	LARANJA
	1-Dor torácica (1-6/10) ou sensação de pressão torácica. 2-Alteração de temperatura. Descritor: Temperatura $\geq 39\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou $\geq 38^{\circ}\text{C}$ por mais de 3 dias. 3- Fatores de risco: idade > 60 anos; Histórico de Insuficiência cardíaca, de Doença arterial coronariana, de Arritmias, de Hipertensão arterial sistêmica descompensada; Obesidade; Diabetes mellitus; Doenças pulmonares crônicas; Imunodepressão (inclusive doença falciforme); Doença renal crônica; Hepatopatia crônica	AMARELO
	1- Alteração de temperatura Descritor: Temperatura $>38^{\circ}\text{C}$ por menos de 3 dias ou febre referida. 2. Sintomas Respiratórios leves Descritor: tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, rinorreia, espirros	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores.	AZUL

GESTANTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS AGUDOS		
GESTANTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS AGUDOS (Avaliar-tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, rinorreia, espirros)	1-Sinais de choque Descritor: Hipotensão (PA sistólica $\leq 80\text{mmHg}$), Taquicardia (FC $\geq 120\text{bpm}$) ou Bradicardia (FC $\leq 40\text{ bpm}$), palidez acentuada, sudorese, pele fria, pulso fino, perfusão diminuída ou alteração do nível de consciência. 2-Saturação O2 $< 92\%$ em ar ambiente (a.a.) 3-Respiração Inadequada (sinais de esforço respiratório) Descritor: FR < 10 ou FR $> 22\text{ irpm}$; fala monossilábica/ entrecortada; Cianose. 4- PAS $\geq 160\text{mmHg}$ e/ou PAD $\geq 110\text{ mmHg}$	VERMELHO
	1-Saturação O2 ≥ 93 e $\leq 95\%$ em ar ambiente (a.a.) 2-Dor torácica intensa (7-10/10) 3-PAS $\geq 140\text{mmHg}$ e ou PAD $\geq 90\text{mmHg}$ Descritor: com cefaleia, epigastralgia e/ou alterações visuais	LARANJA
	1-Dor torácica (1-6/10) ou sensação de pressão torácica. 2-Alteração de temperatura. Descritor: Temperatura $\geq 39\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou $\geq 38^{\circ}\text{C}$ por mais de 3 dias. 3- Fatores de risco: idade > 60 anos; Histórico de Insuficiência cardíaca, de Doença arterial coronariana, de Arritmias, de Hipertensão arterial sistêmica descompensada; Obesidade; Diabetes mellitus; Doenças pulmonares crônicas; Imunodepressão (inclusive doença falciforme); Doença renal crônica; Hepatopatia crônica	AMARELO
	1- Alteração de temperatura Descritor: Temperatura $>38^{\circ}\text{C}$ por menos de 3 dias ou febre referida. 2. Sintomas Respiratórios leves Descritor: tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, rinorreia, espirros	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores.	AZUL

CRIANÇAS E ADOLESCENTES <14 ANOS COM RESPIRATÓRIOS AGUDOS

CRIANÇAS E ADOLESCENTES <14 ANOS COM RESPIRATÓRIOS AGUDOS
(Avaliar-tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, rinorreia, espirros)

1- Sinais de choque:

Descritor: Pulsos carotídeo, braquial ou femoral ausentes ou finos; Ausência de sons cardíacos; Tempo de enchimento capilar > 2 segundos; FC < 60 bpm (entre 0 e 12 anos) ou ≤ 40 bpm se ≥ 12 anos de idade; palidez acentuada, sudorese, pele fria, azulada ou marmórea (cianose); cianose central (lábios, mucosas) e/ ou alteração do nível de consciência.

2- Respiração inadequada ou esforço respiratório acentuado

Descritor: Respiração irregular (*gasping*) ou ausência de respiração ou movimento torácico (apnéia); Gemência; Movimentos tóraco-abdominais paradoxais; Batimento de aletas nasais; Inspiração ruidosa ou difícil (estridor); Fala, choro ou mamada entrecortados; FR < 10 irpm; SatO₂ $\leq 88\%$ em ar ambiente.

3- Alteração neurológica

Descritor: Ausência de reações ou tônus muscular; Alteração do nível de consciência; Crise convulsiva; Agitação psicomotora recente; ou Sinais neurológicos focais agudos.

4- Sinais de desidratação grave

Descritor: Sinal da prega, choro sem lágrima e fontanela deprimida, ausência de diurese nas últimas 12h

VERMELHO

1- Sinais respiratórios

Descritor: Sibilos, estertores ou guinchos; Sinais de esforço moderados (retrações torácicas, subdiafragmáticas ou de fúrcula); FR aumentada para a idade (tabela 1) e/ ou SatO₂ $\geq 89\%$ e $\leq 93\%$ em ar ambiente.

2- Taquicardia

Descritor: FC aumentada para a idade

3- Temperatura

Descritor: Temperatura < 35,9°C ou $\geq 38,5^\circ\text{C}$ até 3 meses de idade; Temperatura $\geq 39,5^\circ\text{C}$ > 3 meses de idade.

4- Sangramento espontâneo ou equimose.**5- Sinais leves de desidratação:**

Descritor: Olhos encovados, saliva espessa, mucosas secas.

6- Dor torácica intensa (7-10/10).

LARANJA

	1-Tosse frequente emetizante Descritor: Acessos de tosse seca espasmódica que culmina em vômito. 2-Temperatura: Descritores: Temp de 37,8°C a 38,4°C até 3 meses de idade ou Temperatura de 38,5°C a 39,4°C > 3 meses de idade na admissão ou Presença de febre > 38°C e persistente (≥ 3 dias). 3- Dor torácica (1-6/10) 4- Fatores de risco Histórico de internações no último ano por crise grave de asma ou apneia, com necessidade de intubação e ventilação; Portadores de doença respiratória crônica (asma moderada ou grave, fibrose cística, displasia broncopulmonar, hipertensão arterial pulmonar dentre outras), Cardiopatias que necessitem de acompanhamento especializado regular, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, Diabetes Mellitus, Imunossuprimidos, trissomias, obesidade, hemoglobinopatias.	AMARELO
	1- Sintomas Respiratórios leves: Descritor: tosse, dor de garganta, coriza, congestão nasal, rinorreia, espirros, dor de ouvido. 2-Temperatura entre 37,5°C e 38,4°C > 3 meses de idade. 3-Sintomas gastrointestinais 4-Dor muscular: Descritor: Sintomas respiratórios leves com relato ou sinais de dor muscular.	VERDE
	1-Nenhum dos determinantes anteriores.	AZUL



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Saúde